



Facultad de  
Ciencias Agrarias  
y Forestales



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

# CURSO DE INGRESO 2021

## Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

# MATEMÁTICA

## Capítulo 1

Material de apoyo para el curso de Nivelación de Matemática para los ingresantes a las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.

# Índice

<b>1. Conjuntos numéricos y Operaciones elementales</b>	<b>3</b>
1.1. Conjuntos numéricos . . . . .	3
1.1.1. Números Naturales ( $\mathbb{N}$ ) . . . . .	4
1.1.2. Números Enteros ( $\mathbb{Z}$ ) . . . . .	4
1.1.3. Números Racionales o Fraccionarios ( $\mathbb{Q}$ ) . . . . .	5
1.1.4. Números Reales . . . . .	7
1.2. Operaciones Elementales . . . . .	8
1.2.1. Suma . . . . .	8
1.2.2. Producto . . . . .	10
1.2.3. División . . . . .	14
1.2.4. Potenciación . . . . .	15
1.2.5. Radicación . . . . .	18
1.3. Cálculos combinados . . . . .	21

# 1. Conjuntos numéricos y Operaciones elementales

## Actividad Inicial

Un docente del Ingreso pensó en comprar sanguchitos de miga para compartir con el curso pero ... ¿Cuántos sanguchitos debería comprar?

Como en la lista de su comisión hay anotados **27 alumnos**, serán 28 incluyéndolo. Los sanguchitos se venden por docena. Entonces pensó en comprar 84 ya que 84 es **múltiplo** de 12 y de 28 y así los podría **repartir equitativamente**. De esa forma, serán 3 para cada uno.

84 sanguchitos son **7 docenas** y la docena le costó 37 pesos. Así que gastó **\$259** pesos que pagó con un billete de **\$500** y le dieron **\$241** de vuelto.

- 1) Escriban simbólicamente todas las operaciones que realizó el docente.
- 2) Justifiquen que 84 sea múltiplo de 28 y 12. Den otro ejemplo de un número que sea múltiplo de 28 y 12. ¿Hay un múltiplo común entre 28 y 12 más chico que 84?
- 3) Para calcular mentalmente el costo de las 7 docenas de sanguchitos el docente pensó: 37 es 30 más 7, 7 por 7 es 49, 7 por 30 es 210, y 210 más 49 es 259. Justifiquen esa forma de realizar el cálculo haciendo mención a la propiedad o propiedades utilizadas.
- 4) Si hubiesen faltado 3 alumnos, ¿cuántos sanguchitos serían para cada uno? Respondan utilizando el algoritmo de la división para números naturales.

### 1.1. Conjuntos numéricos

La **noción de número** es uno de los conceptos más antiguos de la humanidad y es de gran importancia en la vida cotidiana. Ya los pueblos primitivos utilizaban piedras para contar sus rebaños. Desde los primeros tiempos el hombre tuvo la necesidad de representar cantidades de lo que tenía para saber con qué contaba exactamente y poder negociar. De ahí surgió la necesidad de crear símbolos que representaran esas cantidades.

Estudiaremos cuatro conjuntos numéricos en particular, los números naturales, los números enteros, los números racionales o fraccionarios y los números reales.

Estos conjuntos numéricos han ido apareciendo a medida que la humanidad se ha visto en la necesidad de solucionar problemas y retos cada vez más complejos y más profundos.

### 1.1.1. Números Naturales ( $\mathbb{N}$ )

El primer conjunto numérico que analizaremos es el de los **números naturales**. Este es el conjunto de números que usamos para contar y lo representaremos con la letra  $\mathbb{N}$ . Como conjunto podríamos representarlo de la siguiente forma:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}^*$$

Este conjunto tiene un primer elemento (el 0) y tiene un orden implícito, en el cual cada número es menor que los siguientes y mayor que los anteriores. Dado un número natural  $n$ , se define a su siguiente como  $n+1$ , y a su anterior como  $n-1$  (siempre que  $n$  no sea el cero).

¿Cuál es el último número natural? No hay, sencillamente no existe un número natural que sea más grande que todos los demás, ya que cada vez que pensamos en uno, podemos encontrar muchos que sean mayores que él (y por eso los puntos suspensivos en la notación de conjunto).

Este orden permite representar a los números naturales como puntos aislados sobre una recta. En su extremo izquierdo ubicamos al 0 y hacia la derecha, separados entre sí en una misma distancia arbitraria, se encuentran el resto de los números, en orden creciente. Esto es:



Los números naturales se pueden sumar y multiplicar. El resultado de estas operaciones es siempre un número natural. Pero la resta no siempre es posible con los elementos de este conjunto numérico. Por ejemplo, dado dos números naturales  $a$  y  $b$ , la resta  $b-a$  puede realizarse sólo si  $b$  es mayor que  $a$ .

### 1.1.2. Números Enteros ( $\mathbb{Z}$ )

Como dijimos, los números naturales no siempre pueden restarse. Por ejemplo  $3 - 4$  no es una operación que se pueda realizar en  $\mathbb{N}$ . Fue necesario crear un nuevo conjunto numérico para describir este tipo de situaciones: *los números enteros negativos*  $-1, -2, -3, -4, \dots$ . Éstos, junto a los naturales, forman lo que se conoce como el conjunto de los **números enteros** y lo representaremos con la letra  $\mathbb{Z}$ . Como conjunto podríamos representarlo de la siguiente forma:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Noten que este conjunto conserva la idea de orden que tenía el conjunto de los naturales, pero a diferencia de éste, no tiene un primer elemento ¿Por qué?

Podemos extender la representación gráfica del conjuntode la diguiente manera: en algún punto arbitrario de la recta colocamos el 0, hacia su derecha siguen estando los números naturales (que son enteros positivos) y a su izquierda agregamos los números negativos (cada uno separado una misma distancia arbitraria). Miren atentamente esta representación ¿Qué otras diferencias encuentran con la de los números naturales?


---

\*Algunos matemáticos prefieren no incluir al 0 entre los números naturales, pero en este caso sí lo incluiremos para utilizarlo en muchas de las propiedades que enunciaremos.



En esta representación, podemos ver que cada número tiene un par que le corresponde y está ubicado a la misma distancia del 0, pero del lado opuesto. Es lógico pensar en llamar a ese número su **opuesto** y lo representaremos como el mismo número, pero con un “-” adelante. **Opuesto**

Es decir que dado un número entero  $a$  definimos a su opuesto como  $-a$ .



**Actividad:**

1. Discutan en grupo y respondan: ¿El opuesto de un número es necesariamente negativo? ¿Cuánto vale por ejemplo con el opuesto de  $-2$ ?
2. Analicen la siguiente frase: “Para cualquier  $a \in \mathbb{Z}$  se sabe que  $-a$  es siempre negativo”. Decidir si es verdadera o falsa. Discutan en grupo por qué es verdadera o por qué es falsa.

**Observación:** El 0 es el único número que es igual a su opuesto (y por lo tanto puede decirse que no tiene signo, es decir que no es ni positivo ni negativo).

**1.1.3. Números Racionales o Fraccionarios ( $\mathbb{Q}$ )**

Hasta ahora hemos estudiado los número enteros y los naturales. Estos dos conjuntos de números tienen sus elementos “separados” entre si una misma distancia: la unidad. Es decir, se puede pasar de un entero a su siguiente sumándole 1 (o a su anterior restándole 1), pero no hay ningún otro número entero entre ambos.

Analicemos las siguientes situaciones:

Supongamos que disponemos de una bolsa de arena y la dividimos en dos partes iguales, decimos que cada parte es la mitad de la bolsa, es decir  $\frac{1}{2}$  de la bolsa.

También podríamos pensar en el caso de que cortamos una pizza en 8 porciones iguales, cada porción es  $\frac{1}{8}$  de la pizza, entonces si comemos 3 porciones estaríamos comiendo  $\frac{3}{8}$  de la pizza.

Ante la necesidad de dividir a la unidad en porciones más pequeñas y representar matemáticamente estas nuevas cantidades, se definen los **números racionales** o **fracciones**.

**Generalizando:**

Suponiendo que tenemos una unidad y la dividimos en  $n$  partes iguales, cada parte es la  $n$ ésima parte de la unidad y se simboliza como  $\frac{1}{n}$ .

Si tomamos  $m$  **de las  $n$ ésimas partes**, decimos que esta cantidad es  $\frac{m}{n}$ .

El conjunto formado por todos los números enteros y todas las fracciones se llama **números racionales** y se representa con la letra **Q**:


$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \text{ tales que } m \text{ y } n \in \mathbb{Z}, \text{ con } n \neq 0 \right\}$$

**Numerador**  $m$  es el **numerador** y nos indica el número de partes elegidas.

**Denominador**  $n$  es el **denominador** que nos indica en cuántas partes se ha dividido a la unidad. El **denominador** tiene que ser siempre **distinto de cero**.

**Forma decimal** Todo número racional puede escribirse también en **forma decimal**, ya sea con decimales **exactos** (es decir con parte decimal finita), como por ejemplo  $\frac{3}{2} = 1,5$  o con decimales **periódicos** (que una determinada secuencia se repite indefinidamente), como por ejemplo  $\frac{1}{3} = 0,\hat{3} = 0,333333\dots$

Podemos agregar los números racionales a la recta numérica, ahora entre dos números enteros habrá una de infinidad de números intermedios\*. Para ubicar una fracción sobre esta recta tenemos que dividir a la unidad en la cantidad que indique el denominador y tomar tantas de estas partes como indique el numerador. Por ejemplo:



Fraciones equivalentes:

En general existen infinitas formas de representar una determinada fracción. Por ejemplo, si cortamos una pizza de la forma tradicional (8 porciones) cada porción representa  $\frac{1}{8}$  de pizza. Ahora bien, si nos comemos 4 de estas porciones habremos comido  $\frac{4}{8}$  de pizza, que es lo mismo que  $\frac{1}{2}$  de pizza (media pizza).

**Fraciones equivalentes**

A todas las fracciones que representan un mismo número se las conoce como **fracciones equivalentes**. Para obtener fracciones equivalentes a partir de una fracción dada debemos multiplicar (o dividir) el numerador y el denominador por un mismo número (**Ojo: siempre distinto de 0**).

**Actividad:** Encuentren fracciones equivalentes de las siguientes fracciones ¿Cuántas hay?

$$\frac{3}{2} = \dots \quad ; \quad \frac{5}{3} = \dots \quad ; \quad \frac{-1}{4} = \dots$$

**Simplificación de una fracción**

Si en lugar de multiplicar se divide el numerador y el denominador por un mismo número también se obtienen fracciones equivalentes, pero a este proceso se lo conoce como **simplificación**.

**Fraciones irreducibles**

La simplificación puede seguirse hasta que el numerador y el denominador no tengan factores primos en común. A este tipo de fracciones se las conoce como **fracciones irreducibles**.

**Dato útil:** En general conviene trabajar con fracciones irreducibles, para que las

\*Sin embargo todavía no estarán todos los puntos de la recta.

cuentas sean más sencillas. Por lo tanto es recomendable **simplificar las fracciones antes** de realizar cualquier otra operación.

**Actividad:** Simplificar hasta obtener fracciones irreducibles.

$$\frac{16}{40} = \dots \quad ; \quad \frac{32}{12} = \dots \quad ; \quad \frac{75}{60} = \dots$$

**Aclaración:** Si se cancela completamente el numerador, o el denominador, debe dejarse un 1 en su lugar. En el caso de que esto suceda en el denominador, no es necesario escribirlo, ya que las fracciones con denominador 1 son números enteros.

Ejemplos:

$$\frac{4}{12} = \frac{\cancel{4}^1}{\cancel{12}_3} = \frac{1}{3} \qquad \frac{30}{6} = \frac{\cancel{30}^5}{\cancel{6}_1} = \frac{5}{1} = 5$$

### 1.1.4. Números Reales

De a poco fuimos completando los diferentes conjuntos numéricos. Comenzamos con los naturales, luego incluimos sus opuestos (los enteros negativos) para formar los enteros, finalmente partimos en varias partes a cada uno de estos para generar las fracciones y así obtuvimos los números racionales.

Sin embargo, todavía la recta numérica no está completa, faltan incluir todos aquellos números que no se pueden expresar como cociente de enteros. A estos números se los conoce como **números irracionales** porque no se pueden expresar como una razón o cociente entre dos números enteros y se los representa con la letra **I**.

Números irracionales


En la representación decimal, los **números irracionales** se caracterizan por tener infinitos decimales no periódicos, como por ejemplo:

$$\sqrt{2} = 1,41421356237309\dots \quad ; \quad \pi = 3,14159265358979323\dots$$

Los números irracionales junto a los números racionales forman el conjunto de los **números reales**. Este es el conjunto con el que trabajaremos de aquí en más en esta guía y a lo largo de la materia de *Matemática*. Al conjunto de los reales se lo representa con la letra **R**.

Números reales

A este conjunto podremos ahora si representarlo como la recta numérica **completa**, donde cada punto de ésta corresponde a un número racional o irracional. A los números irracionales debemos ubicarlos en la recta de forma aproximada. Por ejemplo:



## 1.2. Operaciones Elementales

### 1.2.1. Suma

**Sumando** Como ya es sabido la operación de suma se utiliza para reunir a varios números en uno sólo. A cada número que forma parte de la suma se lo llama **sumando**.

Repasaremos antes de continuar con las demás operaciones las propiedades de la **suma**.

#### Propiedades de la suma

de la suma  
Cerrada

**I** Si  $a$  y  $b \in \mathbb{R}$  entonces:  $a + b \in \mathbb{R}$

Es decir la suma de dos números reales da un número real.

Ejemplo:  $2$  y  $\frac{2}{3} \in \mathbb{R} \Rightarrow 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \in \mathbb{R}$

Conmutativa

**II** Si  $a$  y  $b \in \mathbb{R}$  entonces:  $a + b = b + a$

Es decir el orden de los sumandos no altera a la suma.

Ejemplo:  $-5 + 3 = 3 + (-5)$   
 $-2 = -2$

Asociativa

**III** Si  $a$ ,  $b$  y  $c \in \mathbb{R}$  entonces:

$$(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$$

Es decir que la forma en que se agrupan los sumandos no altera el resultado de la suma.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} (-7 + 3) + \frac{1}{2} &= -7 + (3 + \frac{1}{2}) = -7 + 3 + \frac{1}{2} \\ -4 + \frac{1}{2} &= -7 + \frac{7}{2} = \frac{-14 + 6 + 1}{2} \\ -\frac{7}{2} &= -\frac{7}{2} = -\frac{7}{2} \end{aligned}$$

**Aclaración:** Como consecuencia de la propiedad asociativa, pueden omitirse los paréntesis cuando se sumen varios números.

Elemento  
neutro (0)

**IV** Si  $a \in \mathbb{R}$ , entonces:  $a + 0 = a$

Es decir que cualquier número sumado a 0 da el mismo número.

Ejemplo:  $\sqrt{5} + 0 = \sqrt{5}$

V Si  $a \in \mathbb{R}$ , entonces:  $a + (-a) = 0$

Opuesto

Es decir que cualquier número sumado a su opuesto da como resultado 0.

Ejemplo:  $7, 15 + (-7, 15) = 0$

**Aclaración:** Como consecuencia de esta propiedad se puede pensar a la resta como la suma de un opuesto. Una ventaja de esto es que al pensarlo así no es necesario definir una nueva operación (la resta) y que podemos utilizar todas las propiedades de la suma antes mencionadas.

**Ojo:** Si bien la resta no es conmutativa ( $2 - 3 \neq 3 - 2$ ), la podemos pensar como la suma de un opuesto entonces si lo es, siempre y cuando mantengamos el signo acompañando al número que corresponde.

Ejemplo:

$$\begin{array}{rcl} 3 - 5 & \neq & 5 - 3 \\ -2 & \neq & 2 \end{array} \quad \text{pero} \quad \begin{array}{rcl} = & 3 + (-5) & = (-5) + 3 \\ -2 & = & -2 \end{array}$$

**Actividad:** Piensen y discutan con sus compañeros ejemplos que verifiquen cada una de las propiedades de la suma.

### Suma y Resta de fracciones

Para sumar (o restar) dos números racionales podremos hacerlo de forma sencilla si ambos tienen **el mismo denominador** (ya que estaremos sumando “porciones del mismo tamaño”).

Suma y resta de fracciones

Ejemplo: tres porciones de pizza más seis porciones de pizza son nueve porciones de pizza. Esta situación puede escribirse en notación de fracciones como:

$$\frac{3}{8} + \frac{6}{8} = \frac{3+6}{8} = \frac{9}{8}$$

Si queremos generalizar esto podríamos decir que si se tienen **dos fracciones de mismo denominador** (o sea  $\frac{a}{c}$  y  $\frac{b}{c} \in \mathbb{Q}$ ), entonces:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

Suma de fracciones con mismo denominador

Ahora bien, si tenemos **dos fracciones con diferente denominador** será necesario obtener fracciones equivalentes a éstas pero que tengan entre si el mismo denominador y así luego podremos sumarlas directamente.

Ejemplo:

Si se comieron tres porciones de pizza y luego un cuarto de pizza, no podemos sumar tres más uno para saber cuánto se comió, debemos **convertir** el cuarto de

pizza a **porciones** antes de sumar. Como un cuarto de pizza equivale a 2 porciones de pizza, en total tendremos que se comieron 5 porciones de pizza.

Esta situación puede escribirse en notación de fracciones como:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{3+2}{8} = \frac{5}{8}$$

Para encontrar el denominador común que tienen las fracciones debemos usar el Mínimo Común Múltiplo (MCM) entre los denominadores de todas las fracciones de la suma (o resta) (para un repaso del MCM ver el Anexo 1 en la pág. ??).

Ejemplo:

Supongamos que queremos restar  $\frac{5}{12}$  y  $\frac{3}{16}$ . Primero debemos encontrar la descomposición en factores primos de cada uno de los denominadores, para hallar el MCM(12, 16). Esto es:

12	2	16	2	Por lo tanto: $12 = 2^2 \cdot 3$ $16 = 2^4$
6	2	8	2	
3	3	4	2	
1		2	2	
	1			

$$\text{Entonces: } \text{MCM}(12, 16) = 2^4 \cdot 3 = 48$$

Es decir que el denominador común de ambas fracciones es 48, o dicho de otra forma: debemos encontrar fracciones de denominador 48 que sean equivalentes a las que deseamos restar.

La resta queda:

$$\frac{5}{12} - \frac{3}{16} = \frac{20}{48} - \frac{9}{48} = \frac{20-9}{48} = \frac{11}{48}$$

### 1.2.2. Producto

Como sabemos, el producto de dos números es el resultado de sumar uno de los números tantas veces como indique el otro número. A cada uno de los números que

**Factor** se están multiplicando se los denomina **factor**.

Ejemplo:

$$3 \cdot 4 = \underbrace{4 + 4 + 4}_{3 \text{ veces}} = \underbrace{3 + 3 + 3 + 3}_{4 \text{ veces}} = 12$$

*Notación:* Muchas veces en matemática se omite el símbolo "·" de la multiplicación (sobre todo cuando se trabaja con paréntesis o con letras). Es decir:

$$2 \cdot b = 2b \qquad 3 \cdot (x - a) = 3(x - a)$$

#### Propiedades del producto

Propiedades del producto

Cerrado

**I** Si  $a$  y  $b \in \mathbb{R}$  entonces:

$$\mathbf{a \cdot b \in \mathbb{R}}$$

Es decir el producto de dos números reales da un número real.

Ejemplo:  $2 \text{ y } \frac{2}{3} \in \mathbb{R} \Rightarrow 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \in \mathbb{R}$

**II** Si  $a$  y  $b \in \mathbb{R}$  entonces:  $\mathbf{a \cdot b = b \cdot a}$  **Conmutativo**

Es decir el orden de los factores no altera el producto.

Ejemplo: 
$$\begin{aligned} -5 \cdot 3 &= 3 \cdot (-5) \\ -15 &= -15 \end{aligned}$$

**III** Si  $a$ ,  $b$  y  $c \in \mathbb{R}$  entonces: **Asociativo**

$$\mathbf{(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c}$$

Es decir que la forma en que se agrupen los factores no altera el resultado del producto.

Ejemplo: 
$$\begin{aligned} (-4 \cdot 3) \cdot \frac{1}{2} &= -4 \cdot (3 \cdot \frac{1}{2}) = -4 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \\ -12 \cdot \frac{1}{2} &= -4 \cdot \frac{3}{2} = -\frac{12}{2} \\ -6 &= -6 = -6 \end{aligned}$$

**Aclaración:** Nuevamente como consecuencia de la propiedad asociativa, pueden omitirse los paréntesis cuando se multipliquen varios números.

**IV** Si  $a \in \mathbb{R}$ , entonces:  $\mathbf{a \cdot 1 = a}$  **Elemento neutro (1)**

Es decir que cualquier número real multiplicado por 1 da el mismo número.

Ejemplo: 
$$\sqrt{5} \cdot 1 = \sqrt{5}$$

**V** Si  $a$ ,  $b$  y  $c \in \mathbb{R}$  entonces: **Distributiva respecto a la suma**

$$\mathbf{a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c}$$

Es decir para resolver el producto entre un número y una suma, es lo mismo primero resolver la suma y luego multiplicar, o bien primero multiplicar dicho número por ambos sumandos y luego sumar\*.

Ejemplo:

---

\*Al proceso inverso de usar la propiedad distributiva se lo llama **sacar factor común**.

$$\frac{2}{5}(1-6) = \frac{2}{5} \cdot 1 - \frac{2}{5} \cdot 6$$

$$\frac{2}{5}(-5) = \frac{2}{5} - \frac{12}{5}$$

$$-2 = -\frac{10}{5}$$

$$-2 = -2$$

**Inverso  
multiplicativo**

**VI** Si  $a \in \mathbb{R}$ , con  $a \neq 0$ , entonces:

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

Es decir todo número real no nulo tiene un inverso multiplicativo y el resultado de multiplicar cualquier número (no nulo) por su inverso multiplicativo es 1.

Ejemplo:

$$7 \cdot \frac{1}{7} = 1$$

**Actividad:** Encuentren los inversos multiplicativos de  $\frac{3}{4}$ ;  $-\frac{5}{2}$  y de  $\frac{1}{2}$ . Luego discutan con sus compañeros: ¿Cuál es inverso multiplicativo de una fracción  $\frac{a}{b}$  genérica?

**Regla de  
los signos**

**VII** El producto de dos números del mismo signo da número positivo, mientras que el producto de dos números de distinto signo es un número negativo.

Es decir:

Producto	Resultado
+ por +	+
- por -	+
+ por -	-
- por +	-

*Notación:* Cuando trabajamos con números negativos es esencial utilizar paréntesis de manera adecuada. Por ejemplo, si queremos escribir el producto de 2 por -3 se debe escribir:

$$2 \cdot (-3) \quad \text{o} \quad 2(-3)$$

Pero, para no confundirlo con una resta, **no** debe escribirse como:

$$2 \cdot -3$$

Cuando en cambio el número negativo es el primero del producto pueden omitirse los paréntesis, es decir se puede escribir de cualquiera de las formas:

$$(-2) \cdot 3 \quad \text{o} \quad -2 \cdot 3$$

**Actividad:** Piensen y discutan con sus compañeros ejemplos que verifiquen cada una de las propiedades del producto.

### Producto de fracciones

El producto de dos o más fracciones da como resultado una nueva fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y el denominador es el producto de los denominadores.

**Producto de fracciones**

Es decir:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplos:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 5} = \frac{14}{15} \quad -\frac{2}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{(-2) \cdot (-3)}{5 \cdot 5} = \frac{6}{25}$$

Esta definición nos permite establecer reglas para simplificar las fracciones *antes* de realizar el producto\*. En este caso, como el nuevo numerador está formado por el producto de los numeradores y el nuevo denominador está formado por el producto de los denominadores, se puede **simplificar cualquier numerador con cualquier denominador**.

**Regla de simplificación para el producto de fracciones**

**Actividad:** Simplifiquen las siguientes fracciones y luego multipliquen:

$$\frac{8}{15} \cdot \frac{25}{12}$$

Ahora primero multipliquen y luego simplifiquen. Discutan con sus compañeros qué sucede con el resultado en ambos casos. ¿Cuál de los procedimientos les resultó mas simple?

### Cálculo de Porcentajes

Una aplicación muy útil del producto de números racionales es para el cálculo de porcentajes, una operación muy común en la vida cotidiana. El porcentaje (por ejemplo 10 %, 25 %, 63 %, etc.) hace referencia a una proporción de algo. Es decir que siempre que hablemos de porcentaje debemos hacer referencia a la cantidad de la que estamos hablando. Por ejemplo no es lo mismo el 5 % de 240 que el 5 % de 3.000.000.

**Cálculo de porcentajes**

### ¿Cómo se calcula un porcentaje?

Para calcular porcentajes deberemos realizar el producto de un número racional (por ejemplo  $\frac{12}{100}$  si quisiéramos calcular el 12 % de alguna cantidad) por otro número (que es justamente dicha cantidad).

### Generalizando:

---

\*De todas formas nada nos impide realizar el producto y simplificar luego, pero generalmente es recomendable simplificar antes de hacer las cuentas, para trabajar con números menores.

**Cálculo del X % de A** El X % de una cantidad A se calcula como:

$$\frac{X}{100} \cdot A *$$

### 1.2.3. División

#### División en los Naturales

**División en los Naturales** La división es una operación no del todo completa en el conjunto de los naturales, en el sentido de que no toda división entre dos naturales da como resultado un nuevo número natural.

Ejemplos:

6 dividido 3 es 2, pero 5 dividido 2 no se puede realizar en  $\mathbb{N}$

Sin embargo, se puede definir el **algoritmo de la división**, que nos dará como resultado dos números naturales: el **cociente** y el **resto**.

**Actividad:** Discutan en grupo y recuerden: ¿cuál es el cociente y cuál es el resto en una división? Definan con sus palabras ambos conceptos.

#### Múltiplos:

**Múltiplos** Se dice que un número  $a$  es múltiplo de  $b$  si se cumple que existe algún número entero  $K$ , tal que:

$$a = K \cdot b$$

#### Divisibilidad:

**Divisibilidad** Si el resto de la división de  $a$  dividido  $b$  es 0, se dice que  $a$  es **divisible** por  $b$ .

**Observación:** Si  $a$  es divisible por  $b$ , entonces también puede afirmarse que  $a$  es múltiplo de  $b$ .

#### Números primos:

**Números primos** Un número natural (mayor que 1) se dice que es un **número primo** si es divisible sólo por 1 y por él mismo.

Existen infinitos números primos, pero los primeros 10 números primos son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29...

---

\*Muchos de ustedes tal vez estén acostumbrados a usar la regla de tres simple para calcular porcentajes (y es perfectamente válido siempre y cuando se use correctamente), pero esta forma de calcularlo es muy práctica, sobre todo para el planteo de ecuaciones, como veremos más adelante.

### División en los Reales

La división entre dos número reales  $a$  y  $b$  puede interpretarse como el producto de  $a$  con el inverso multiplicativo de  $b$ , es decir  $\frac{1}{b}$ . Esta interpretación nos permite utilizar en la división todas las propiedades del producto.

**Aclaración:** La regla de los signos para la división es igual a la del producto. Es decir al dividir dos números de igual signo el resultado es positivo, mientras que si se dividen números de diferentes signos el resultado es negativo.

### División de Fracciones

La existencia del inverso multiplicativo nos permite resolver la división como una multiplicación por el inverso del divisor\*.

**División de Fracciones**

En otras palabras para dividir dos fracciones, debemos dar vuelta la segunda fracción y luego multiplicar normalmente:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Esta forma de resolver una división de fracciones (como un producto) permite utilizar todas las propiedades vistas para el producto también en la división.

Ejemplos:

$$\frac{3}{7} : \frac{2}{5} = \frac{3}{7} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{14} \qquad -\frac{2}{15} : \frac{3}{8} = -\frac{2}{15} \cdot \frac{8}{3} = -\frac{16}{45}$$

$$\frac{12}{25} : \frac{8}{15} = \frac{12}{25} \cdot \frac{15}{8} = \frac{\cancel{12}^3}{\cancel{25}_5} \cdot \frac{\cancel{15}_3}{\cancel{8}_2} = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{10}$$

#### 1.2.4. Potenciación

La potenciación de números reales se define como la multiplicación de un número real por si mismo una cierta cantidad de veces. Al número que estamos multiplicando se lo denomina **base** y al número que indica la cantidad de veces que se debe multiplicar se lo llama **exponente**.

**Base y exponente**

Ejemplo:

$$3^5 = \underbrace{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}_{5 \text{ veces}}$$

Que se lee: “tres elevado a la cinco” o “tres a la quinta”.

---

\*Probablemente hayas aprendido a realizar la división de fracciones como un producto cruzado, sin embargo esta forma que proponemos aquí nos permite realizar de manera más sencilla las simplificaciones antes de multiplicar como vimos en secciones anteriores.

**Definición  
de potencia  
con exponente  
Natural**

En general, si  $a \in \mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{N}^*$  se define la potencia  $n$ -ésima de  $a$  como:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ veces}}$$

**Propiedades  
del producto**

### Propiedades de la potencia

**Exponente 1**

**I** Si  $a \in \mathbb{R}$  entonces:  $a^1 = a$

Es decir todo número real elevado a la 1 es igual al mismo número.

**Exponente 0**

**II** Si  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$  entonces:  $a^0 = 1$

Es decir todo número distinto de cero elevado a la 0 da 1.

**Producto de  
potencias de  
igual base**

**III** Si  $a \in \mathbb{R}$  y  $m, n \in \mathbb{Z}$  entonces:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Es decir el producto de potencias de igual base es una nueva potencia, con la misma base, cuyo exponente es la suma de los exponentes originales.

**Cociente de  
potencias de  
igual base**

**IV** Si  $a \in \mathbb{R}$  y  $m, n \in \mathbb{Z}$  entonces:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Es decir el cociente de potencias de igual base es una nueva potencia, con la misma base, cuyo exponente es la resta de los exponentes originales.

**Potencia de  
potencia**

**V** Si  $a \in \mathbb{R}$  y  $m, n \in \mathbb{Z}$  entonces:

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Es decir la potencia de una potencia es una nueva potencia, con igual base, cuyo exponente es el producto de los exponentes.

**Distributiva  
respecto al  
producto**

**VI** Si  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{Z}$  entonces:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Es decir la potencia de un producto es igual al producto de las potencias de los factores.

---

\*Si bien aquí se enuncian las propiedades de la potencia para  $n \in \mathbb{N}$ , veremos más adelante que  $n$  puede ser cualquier número racional y estas propiedades siguen siendo válidas

VII Si  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{Z}$  entonces:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

Distributiva  
respecto al  
cociente

Es decir la potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias del numerador y del denominador.

VIII Si  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$  entonces:

$$a^{-1} = \frac{1}{a}$$

Exponente -1

Es decir todo número distinto de cero elevado a la -1 es igual a su inverso multiplicativo.

IX Si  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$  y  $n \in \mathbb{Z}$  entonces:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Exponente  
negativo

Es decir si el exponente es negativo, entonces debe cambiarse la base por su inverso multiplicativo y el exponente por su opuesto.

**Actividad:** Piensen y discutan con sus compañeros ejemplos que verifiquen cada una de las propiedades de la potencia. Elijan valores negativos tanto para las **bases** como para los **exponentes** en algunos de dichos ejemplos.

**IMPORTANTE:** La potencia **NO** es distributiva respecto a la suma/resta

Es decir:

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n \quad \text{y} \quad (a - b)^n \neq a^n - b^n$$

**Aclaración:** Debido a la regla de los signos para el producto se puede conocer el signo del resultado de una potencia en base al signo de la base y la paridad del exponente. Los exponentes pares darán siempre resultados positivos y los exponentes impares darán resultados que conservarán el signo de la base.

Signo de la  
potencia

En resumen:

Base	Exponente	Resultado
+	par	+
-	par	+
+	impar	+
-	impar	-

Ejemplos:

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16 \quad (-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$$

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 \quad (-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$$

**IMPOTANTE:** Es muy importante el correcto uso de los paréntesis, porque la presencia o no de ellos simboliza cosas diferentes. Es decir:

$$(a \cdot b)^n \neq a \cdot b^n \quad , \quad (-a)^n \neq -a^n \quad , \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n \neq \frac{a^n}{b}$$

Ejemplos:

$$(2 \cdot 3)^2 = (2 \cdot 3) \cdot (2 \cdot 3) = 6 \cdot 6 = 36 \quad \text{no es lo mismo que} \quad 2 \cdot 3^2 = 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 9 = 18$$

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9 \quad \text{no es lo mismo que} \quad -3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \quad \text{no es lo mismo que} \quad \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$$

### 1.2.5. Radicación

La radicación es la operación inversa de la potencia y formalmente se define como:

Dados  $a \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  y  $n > 1$ , se define:

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \text{si y solo si} \quad b^n = a$$

**Radicando**  
e **índice**

Es decir, dado un número real  $a$  y un número natural  $n$  mayor a 1, la raíz enésima de  $a$  es igual a  $b$ , si se cumple que  $b^n = a$ . En esta operación  $a$  se llama **radicando**,  $n$  es el **índice** de la raíz y  $b$  el resultado.

Ejemplo

Para calcular  $\sqrt[3]{8}$  (que se lee como “raíz cúbica de 8”) debemos pensar en un número que elevado a la 3 de como resultado 8, es decir que el resultado es **2**.

**Aclaración Importante:** Debido a la regla de los signos de la potencia (pág.17) se deben tener en cuenta algunas consideraciones respecto de la definición antes formalizada, dependiendo de si el índice de la raíz ( $n$ ) es **par** o **impar**.

**Raíz de**  
**índice par**

- o **Si  $n$  es par:** el radicando  $a$  debe ser **positivo\***. Además el resultado  $b$  será **siempre positivo**.

---

\*Esto es cierto ya que no existen números reales que elevados a una potencia par den como resultados un número negativo (ver reglas de los signos de la potencia en pág. 17)

- o  **$n$  es impar:** tanto el radicando  **$a$**  como el resultado  **$b$**  pueden ser cualquier número real (**positivo o negativo**). Raíz de índice impar

Ejemplos:

$$\sqrt{9} = 3 \text{ ya que } 3^2 = 9 \quad \sqrt[4]{16} = 2 \text{ ya que } 2^4 = 16$$

$$\sqrt[3]{125} = 5 \text{ ya que } 5^3 = 125 \quad \sqrt[5]{-32} = -2 \text{ ya que } (-2)^5 = -32$$

**Aclaración:** Las **raíces de índice par de números reales negativos no existen** en  $\mathbb{R}$ , ya que ningún número real elevado a una potencia par da un como resultado un número negativo. Sin embargo las **raíces de índice impar** están bien definidas tanto para números positivos como negativos y el resultado conserva el signo del radicando.

*Notación:* Por convención en las raíces de índice 2 (llamadas raíces cuadradas) se omite de escribir el índice en la raíz. Es decir:  $\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$ .

### Propiedades de las raíces

Propiedades de las raíces

- I Si  $a$  y  $b \in \mathbb{R}$  (positivos si  $n$  es par) y  $n \in \mathbb{N}$  entonces:

Distributiva respecto al producto

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Es decir la raíz es distributiva respecto al producto.

- II Si  $a$  y  $b \in \mathbb{R}$  (positivos si  $n$  es par)  $b \neq 0$  y  $n \in \mathbb{N}$  entonces:

Distributiva respecto al cociente

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Es decir la raíz es distributiva respecto al cociente.

- III Si  $a \in \mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{N}$  entonces:

Raíces y potencias del mismo orden

- Si  $n$  es par:  $\sqrt[n]{a^n} = |a|$

- Si  $n$  es impar:  $\sqrt[n]{a^n} = a$

Es decir que si tenemos una raíz de una potencia de un mismo orden podemos “cancelarlas” de alguna forma. Si  $n$  es impar, podemos cancelarlas directamente. En cambio si el índice es par se obtiene el valor absoluto del radicando (ver página ??), ya que **las raíces de índice par siempre dan un resultado positivo**.

Raíces como  
potencias  
fraccionarias

IV Si  $a \in \mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{N}$  entonces:  $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$

Es decir que una raíz se puede expresar como una potencia fraccionaria, donde el índice de la raíz es el denominador del exponente.

**Aclaración:** Gracias a que las raíces se pueden expresar como potencias fraccionarias, se pueden aplicar todas las propiedades de la potencia a las raíces.

Raíces y  
potencias

V Si  $a \in \mathbb{R}$  y  $n \in \mathbb{N}$  entonces:

$$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = a^{\frac{m}{n}}$$

Es decir que se puede escribir cualquier combinación de raíces y potencias como una única potencia de exponente fraccionario.

Ejemplos:

$$\sqrt{2 \cdot 5} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{5} \qquad \sqrt[3]{2^3} = 2 \qquad \sqrt[5]{(-2)^5} = -2$$

$$\sqrt{(-3)^2} = 3 \qquad \sqrt[5]{-3} = (-3)^{\frac{1}{5}} \qquad \sqrt[3]{\left(-\frac{2}{3}\right)^3} = -\frac{2}{3}$$

$$\sqrt[5]{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 2^{-\frac{2}{5}} \qquad \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3} \qquad \sqrt[3]{8 \cdot 3} = 2\sqrt[3]{3}$$

**Actividad:** Para cada uno de los ejemplos anteriores determinar qué propiedad fue necesaria para cada paso de la resolución (identifiquen todos los pasos requeridos para la resolución de cada ejemplo).

**IMPORTANTE:** La raíz no es distributiva respecto a la suma o resta

Es decir:

$$\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} \qquad \text{y} \qquad \sqrt[n]{a-b} \neq \sqrt[n]{a} - \sqrt[n]{b}$$

**Actividad:** Calcular  $\sqrt{4+9}$  y  $\sqrt{4} + \sqrt{9}$ . Comparar ambos resultados.

**Racionalización:**

Muchas veces en matemática, cuando tenemos una expresión con una raíz en el denominador, se realiza una operación para obtener una fracción equivalente, pero con denominador entero. Esta operación se conoce como llamada **racionalización**.

Ejemplo:

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

### 1.3. Cálculos combinados

En general las **operaciones elementales** aparecen combinadas entre sí, es decir en una cuenta pueden combinarse varias sumas, productos, potencias y raíces, por eso se llaman **cálculos combinados**.

Para operar correctamente con ellas es de suma importancia saber identificar **términos** y **factores** en la expresión.

Se llama **término** a cada una de las partes que se encuentran separadas por sumas o restas. Se llama **factor** a cada elemento que forma parte de un producto.

**Término**  
**Factor**

Ejemplos:

$12 + 17 \cdot 5 + 8 \rightarrow$  tiene **tres términos** y el segundo término tiene dos factores.

$2 \cdot (3 + 6 + 2) \rightarrow$  así escrita tiene **un sólo** término compuesto de dos factores.

**Observación:** En matemática es importante el correcto uso de los paréntesis, ya que a veces la presencia (o ausencia) de los mismos puede simbolizar expresiones muy diferentes. Por ejemplo:

$$3 \cdot (2 + 4) + 1 = \overbrace{3 \cdot (2 + 4)}^{\text{tér.}} + \overbrace{1}^{\text{tér.}} = 19$$

$$3 \cdot 2 + 4 + 1 = \overbrace{3 \cdot 2}^{\text{tér.}} + \overbrace{4}^{\text{tér.}} + \overbrace{1}^{\text{tér.}} = 11$$

En los cálculos combinados las operaciones matemáticas tiene un orden de prioridad que hay que respetar al realizar los cálculos. En caso de que existan paréntesis, corchetes o algún otro tipo de agrupación, deberá respetarse el orden de éstos, operando de “adentro hacia afuera”. Si no hay paréntesis o corchetes, o bien dentro de cada paréntesis, el orden en que deben realizarse las operaciones es el siguiente:

- 1° Potencias (o raíces)
- 2° Productos (o divisiones)
- 3° Sumas (o restas)

Para no cometer errores al resolver cálculos combinados es necesario **primero separar en términos**, luego resolver cada término y por último realizar las sumas o restas de los resultados.

Ejemplos:

$$2 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 1 = \overbrace{2 \cdot 3} + \overbrace{5 \cdot 2} + \overbrace{2 \cdot 4} + \overbrace{1} = 6 + 10 + 8 + 1 = \boxed{25}$$

$$(1 + 5) \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 7 = \overbrace{(1 + 5) \cdot 2} + \overbrace{4 \cdot 3} + \overbrace{7} = \overbrace{6 \cdot 2} + \overbrace{4 \cdot 3} + \overbrace{7} = 12 + 12 + 7 = \boxed{31}$$

## CURSO DE INGRESO 2021 - MATEMÁTICA

### Ejercicios Capítulo 1

**En todos los ejercicios resolver sin usar calculadora, excepto que se aclare lo contrario**

1. Indicar todos los conjuntos numéricos (Naturales, Enteros, Racionales, Irracionales, Reales) a los que pertenecen los siguientes números.

a)  $\sqrt{3}$                       b)  $\sqrt{9}$                       c)  $-0, \hat{6}$

2. Dados los siguientes números:  $0$  ;  $-0,125$  ;  $\frac{2}{3}$  ;  $-1$  ;  $-3$  ;  $\sqrt{5}$  ;  $-\sqrt{2}$

- a) Ordenarlos de menor a mayor  
b) Graficarlos en la recta numérica

3. Realizar las siguientes sumas y restas de fracciones.

a)  $\frac{1}{4} + \frac{3}{5}$                       b)  $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$                       c)  $\left(\frac{2}{3} - 2\right) + \left(3 - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{5}{3} - 4\right)$

4. Calcular usando las propiedades de la suma y el producto.

a)  $(3 + 8)5 \cdot 2 + 9$                       b)  $-3(5 - 7) + 4(-3)$                       c)  $(2 - 5)(-8 + 3) - 3$   
d)  $3 \cdot (-2) - 4(3 + 2 - 8)$

5. Resolver las siguientes operaciones con fracciones.

a)  $\left(\frac{8}{7} - \frac{4}{5}\right) \cdot \frac{5}{9}$                       b)  $\frac{36}{24} \cdot \left(\frac{4}{3} + \frac{2}{5}\right)$                       c)  $\frac{15}{4} : \frac{25}{3} \cdot \frac{20}{27}$                       d)  $\frac{35/2}{5/4} \cdot \frac{3}{2}$

e)  $\frac{\frac{8}{5} + \frac{3}{2}}{\frac{4}{3}}$                       f)  $\left(\frac{6}{7} : \frac{6}{21} - 1\right) \frac{1}{2} + \frac{3}{7} : \frac{2}{14} - 3$

g)  $\left(\frac{2}{7} - \frac{3}{5}\right) \cdot \left(\frac{2}{11} + 3\right) - 2 \cdot \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{2}\right)$

6. Resolver las siguientes operaciones con números enteros, usando las propiedades de la potencia siempre que sea posible.

a)  $(3 + 2)^2 + 5 \cdot 3 + (2^2)^3$                       b)  $(3 - 5)^4 + 3(3 \cdot 2)^2$                       c)  $(2 \cdot 3^3)^3 \cdot 2^4 \cdot 3$

7. Calcular las siguientes potencias.

$$\text{a) } \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \quad \text{b) } (-2)^{-3} \quad \text{c) } (2)^{-3} \quad \text{d) } \left(-\frac{2}{3}\right)^{-2}$$

8. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, colocando **V** o **F**.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c} & \text{b) } \frac{a}{b+c} = \frac{a}{b} + \frac{a}{c} \\ \text{c) } a \cdot a^2 \cdot a = 3a^2 & \text{d) } (a^3 \cdot a)^3 = a^{12} \\ \text{e) } (a \cdot b)^3 = a^3 \cdot b^3 & \text{f) } (a+b)^3 = a^3 + b^3 \end{array}$$

9. Resolver y simplificar utilizando las propiedades de la potencia.

$$\begin{array}{lllll} \text{a) } 6^2 \cdot 6^5 & \text{b) } 8^{-3} \cdot 8^4 & \text{c) } b^3 \cdot b^{-8} & \text{d) } \frac{7^4}{7^6} & \text{e) } \frac{4^5}{4^{-6}} \\ \text{f) } (2^{-1}a^4b^{-6})(8a^{-3}b^6) & \text{g) } \frac{(ab)^4}{a^{-5}b^4} & \text{h) } \frac{12b^8}{-4b^{-4}} \end{array}$$

10. Calcular las siguientes raíces.

$$\text{a) } -\sqrt{\frac{49}{36}} \quad \text{b) } \sqrt{\frac{81}{144}} \quad \text{c) } -\sqrt[5]{32} \quad \text{d) } -\sqrt[5]{-243}$$

11. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, colocando **V** o **F**.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \frac{1}{\sqrt{2}} = 2 \cdot \sqrt{2} & \text{b) } \sqrt{20} = 2 \cdot \sqrt{5} \\ \text{c) } \sqrt{\sqrt{a}} = \sqrt[4]{a} & \text{d) } \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a+b} \\ \text{e) } \sqrt[5]{a^5} = |a| & \text{f) } \sqrt[4]{b^4} = |b| \end{array}$$

g) La raíz cúbica de un número negativo es un número negativo.

12. Resolver y simplificar utilizando las propiedades de las raíces y las potencias, **indicando qué propiedades utilizan en cada caso**.

$$\text{a) } \sqrt{(-6b)^2} \quad \text{b) } \sqrt{\frac{4a^6b^{-3}}{9a^{-8}b^{-1}}} \quad \text{c) } \left[ \left( \left( \left( \frac{3}{5} \right)^{\frac{1}{2}} \right)^{-\frac{1}{3}} \right)^{-2} \right]$$

13. Calcular

$$\text{a) } \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{6} + \frac{2}{3}\right)^{-1} \qquad \text{b) } \frac{\left(1 - \frac{3}{2}\right) \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4}\right)^2}{\left(\frac{1}{3} - 1\right) \div \left(\frac{2}{5} - 2\right)}$$

$$\text{c) } \left(\sqrt{\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{4}{9} + \frac{1}{5}}\right) \div \frac{16}{3}$$


$$\text{d) } \left[ (5 - 2) \frac{5}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} - 2 \right] \frac{5}{4} \left(\frac{16}{9}\right)^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} \left[ \frac{3}{7} \left(\frac{4}{28}\right)^{-1} - 1 \right]$$

## CURSO DE INGRESO 2021 - MATEMÁTICA

### Respuestas de los Ejercicios del Capítulo 1

1. a) Irracionales y Reales  
 b) Naturales, Enteros, Racionales, Reales  
 c) Racionales, Reales

2. a)  $-3$  ;  $-\sqrt{2}$  ;  $-1$  ;  $-0,125$  ;  $0$  ;  $\frac{2}{3}$  ;  $\sqrt{5}$



3. a)  $\frac{17}{20}$       b)  $\frac{11}{24}$       c)  $\frac{11}{3}$

4. a) 119      b)  $-6$       c) 12      d) 6

5. a)  $\frac{4}{21}$       b) 3      c)  $\frac{1}{3}$       d) 21      e)  $\frac{93}{40}$       f) 1      g)  $-\frac{8}{3}$

6. a) 104      b) 124      c)  $2^7 \cdot 3^{10}$

7. a) 8      b)  $-\frac{1}{8}$       c)  $\frac{1}{8}$       d)  $\frac{9}{4}$

8. a) **V**      b) **F**      c) **F**      d) **V**      e) **V**      f) **V**

9. a)  $6^7$       b) 8      c)  $\frac{1}{b^5}$       d)  $\frac{1}{49}$       e)  $4^{11}$       f)  $4a$

- g)  $a^9$       h)  $-3b^{12}$

10. a)  $-\frac{7}{6}$       b)  $\frac{3}{4}$       c)  $-2$       d) 3

11. a) **F**      b) **V**      c) **V**      d) **F**      e) **F**      f) **V**      g) **V**

12. a)  $6|b|$       b)  $\frac{2|a|^7}{3|b|}$       c)  $\left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\frac{3}{5}}$

13. a) 1      b)  $-\frac{1}{120}$       c)  $\frac{1}{10}$       d) 1



Facultad de  
Ciencias Agrarias  
y Forestales



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

# CURSO DE INGRESO 2021

## Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

# MATEMÁTICA

## Capítulo 2

Material de apoyo para el curso de Nivelación de Matemática para los ingresantes a las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.

# Índice

<b>1. Expresiones algebraicas</b>	<b>3</b>
1.1. Polinomios . . . . .	3
1.1.1. Operaciones con polinomios . . . . .	6
1.2. Factorización . . . . .	10
1.3. Fracciones algebraicas . . . . .	13
1.3.1. Simplificación de fracciones algebraicas . . . . .	13
1.3.2. Suma y Resta de fracciones algebraicas . . . . .	14
1.3.3. Producto y división de fracciones algebraicas . . . . .	15

# 1. Expresiones algebraicas


Llamaremos **expresiones algebraicas** a expresiones compuestas por números y letras relacionadas entre sí por las operaciones básicas. Las letras a las que aquí nos referimos se llaman *indeterminada* o *variable* y en general se utiliza la letra  $x$ , pero podría utilizarse cualquier otra letra.

**Definición de Expresiones Algebraicas**

Ejemplos de expresiones algebraicas:

$$x^2 + 2xy \qquad \frac{xy - 2x}{x^2 + 1} \qquad x^3 + 4x^2 - 5x + 2$$

## ¿Qué tipos de Expresiones Algebraicas existen?



### 1.1. Polinomios

Las expresiones algebraicas más utilizadas son los **Polinomios**.

#### ¿Pero qué son los polinomios?

Si prestamos atención a la etimología de la palabra **polinomio**, vemos que *poli-* significa «muchos» y *-nomios* en este caso se refiere a «términos», es decir que **polinomios** significa «muchos términos».

Los polinomios están formados de

- **constantes**, es decir número reales.
- **variables**, como  $x$  e  $y$
- **exponentes**, aplicados a las variables y que sólo pueden ser **enteros positivos**.

### Definición Formal de Polinomios:


Definición de Polinomios Si  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$  son números reales y  $n$  es un número natural, se llama **Polinomios** a toda expresión algebraica que tenga la forma:

$$P(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

### Elementos de un Polinomio:

- **Variable:** es la indeterminada (en general  $x$  o  $y$ ). Los polinomios pueden tener más de una indeterminada o variable, pero en este curso estudiaremos polinomios con una sola variable.
- **Coefficientes:** son los números reales que multiplican a la variable.
- **Exponentes:** como dijimos antes los exponentes de la variable deben ser siempre números **enteros positivos**.
- **Grado:** es el mayor de los exponentes.
- **Coefficiente principal:** es el coeficiente que acompaña a la variable de mayor exponente.
- **Término independiente:** Es el término que no tiene variable (también se puede decir que tiene la variable  $x$  elevada a la potencia 0).

En el siguiente ejemplo se indican los elementos de un Polinomio:



**Coefficiente Principal: 5**

Ejemplos de Polinomios:

$$5x^3 - x^2 - 2x + 3 \qquad \frac{1}{3}x^2 \qquad x^3 + 4x^2 - 5x + 2$$

*Notación:* A los Polinomios en la indeterminada  $x$  se los simboliza con letras mayúsculas indicando la indeterminada entre paréntesis:  $P(x)$ ;  $Q(x)$ ;  $R(x)$ .

**A continuación se dan algunas definiciones que serán de utilidad para el estudio de Polinomios**

**Definición 1:**

Se llama **polinomio nulo** al polinomio con todos sus coeficientes iguales a cero. Es decir:  $O(x) = 0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n$ . El polinomio nulo no tiene grado. **Polinomio Nulo**

**Definición 2:**

Se llama polinomio **opuesto** de  $P(x)$  al polinomio  $-P(x)$ . **Polinomio Opuesto**

Ejemplo:

Dado  $P(x) = 3x^2 + 2x - 5$ , su polinomio opuesto es:  $-P(x) = -3x^2 - 2x + 5$ .

**Definición 3:**

Se llama **monomio** a los polinomios que tienen un sólo término, **binomios** a los que tienen dos términos y **trinomios** a los que tienen tres términos.

**Actividad:** Decidir cuáles de las siguientes expresiones algebraicas son Polinomios y cuáles no. Indentificar (cuando corresponda) grado, término independiente, coeficiente principal y si son monomios, binomios o trinomios.

$$\begin{array}{ccc} \frac{1}{3}x^2 + 1 & 2\sqrt{x} + 1 & x^{-3} + 4x^2 \\ \sqrt{5}x^2 + 1 & 4 & 2x^3 - 7x^2 + 3\frac{1}{x} \end{array}$$

**Definición 4:**

Se llama **valor numérico** de un Polinomio al número que se obtiene al reemplazar la indeterminada ( $x$ ) por cualquier número real\*. **Valor Numérico**

*Simbólicamente:*

Dado

$$a \in \mathbb{R} : P(a) \text{ es el valor numérico de } P(x)$$

---

\*Como la indeterminada puede reemplazarse por cualquier número, un polinomio tiene infinitos valores numéricos.

**Actividad:** Dado  $P(x) = 2x^2 - 3x + 6$ , encontrar los valores numérico  $P(0)$  y  $P(2)$ .

### Definición 5:

**Raíz de un polinomio**

Se llama **raíz** de un polinomio  $P(x)$  a cualquier número  $a \in \mathbb{R}$  que al reemplazarlo por la variable  $x$  el valor numérico  $P(a)$  de cero.

*Simbólicamente:*

$$a \in \mathbb{R} \text{ es raíz de } P(x) \Leftrightarrow P(a) = 0$$

Ejemplo:

Dado  $P(x) = 3x^2 + 2x - 5$ , se verifica que  $a = 1$  es raíz de  $P(x)$ , pues  $P(1) = 3 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 - 5 = 0$ .

#### 1.1.1. Operaciones con polinomios

Ya que cada símbolo de un Polinomio representa a un número real podemos usar para operar con Polinomios las propiedades de las operaciones con números reales.

#### Suma y Resta

La **suma** de dos polinomios es otro polinomio que se obtiene **agrupando los términos del mismo grado** y sumando sus coeficientes.

Ejemplo:

Si  $P(x) = 2x^2 + 4x + 1$  y  $Q(x) = x^4 - 5x^2 + 2$  entonces:

$$\begin{aligned} P(x) + Q(x) &= (2x^2 + 4x + 1) + (x^4 - 5x^2 + 2) \\ &= x^4 + 2x^2 - 5x^2 + 4x + 1 + 2 \\ &= x^4 + (2 - 5)x^2 + 4x + (1 + 2) \\ &= x^4 - 3x^2 + 4x + 3 \end{aligned}$$

La **resta** entre  $P(x)$  y  $Q(x)$  es equivalente a sumar a  $P(x)$  el opuesto de  $Q(x)$ . Es decir:

$$P(x) - Q(x) = P(x) + [-Q(x)]$$

Ejemplo:

Dados los mismos polinomios del ejemplo anterior:

$$\begin{aligned} P(x) - Q(x) &= (2x^2 + 4x + 1) - (x^4 - 5x^2 + 2) \\ &= 2x^2 + 4x + 1 - x^4 + 5x^2 - 2 \\ &= -x^4 + 2x^2 + 5x^2 + 4x + 1 - 2 \\ &= -x^4 + (2 + 5)x^2 + 4x + (1 - 2) \\ &= -x^4 + 7x^2 + 4x - 1 \end{aligned}$$

## Multiplicación de Polinomios

Para **multiplicar** dos Polinomios se debe realizar una doble distributiva. Es decir se multiplica cada término de uno de los polinomios por todos los términos del otro, y luego se suman los coeficientes de los términos de igual grado, aplicando las propiedades del producto, de la suma y de la potencia vistas en el capítulo anterior.

Ejemplo:

Si  $P(x) = x - 2$  y  $Q(x) = 2x^2 + 3x - 1$  entonces:

$$\begin{aligned}
 P(x) \cdot Q(x) &= (x - 2) \cdot (2x^2 + 3x - 1) \\
 &= x \cdot (2x^2 + 3x - 1) - 2 \cdot (2x^2 + 3x - 1) \\
 &= x \cdot 2x^2 + x \cdot 3x + x \cdot (-1) - 2 \cdot 2x^2 - 2 \cdot 3x - 2 \cdot (-1) \\
 &= 2x^3 + 3x^2 - 1x - 4x^2 - 6x + 2 \\
 &= 2x^3 + 3x^2 - 4x^2 - 1x - 6x + 2 \\
 &= 2x^3 + (3 - 4)x^2 + (-1 - 6)x + 2 \\
 &= 2x^3 - x^2 - 7x + 2
 \end{aligned}$$

## División de Polinomios

Dados dos polinomios  $P(x)$  y  $D(x)$  (con  $D(x) \neq 0(x)$ ), es posible definir la división  $P(x) \div D(x)$ , de la que se obtienen dos nuevos polinomios:  $C(x)$  (**polinomio cociente\***) y  $R(x)$  (**resto**), tal que:

$$P(x) = D(x) \cdot C(x) + R(x)$$

El resto de la división (polinomio  $R(x)$ ) será siempre un polinomio de menor grado de  $D(x)$  o bien  $R(x) = 0$ .

Si  $R(x) = 0$  se dice que  $P(x)$  es **divisible** por  $D(x)$ . En este caso se puede escribir: **Divisibilidad**

$$P(x) = D(x) \cdot C(x) \text{ o también } C(x) = \frac{P(x)}{D(x)}$$

## Regla de Ruffini

Es un procedimiento sencillo que permite hallar el cociente y el resto de una división de Polinomios en **el caso en que el divisor sea un polinomio de la forma  $x - a$** , donde  $a$  puede ser cualquier número real. .

---

\*Este es al que normalmente se lo llama resultado de la división

Ejemplo:

$$\text{Sean } P(x) = 2x^3 - x^2 + 5 \quad \text{y} \quad D(x) = x + 2$$

**Regla de Ruffini**

Para aplicar correctamente la Regla de Ruffini, lo primero que debe hacerse es **ordenar con sus potencias de mayor a menor el polinomio  $P(x)$  y agregar 0 para completar el Polinomio** (es decir que aparezcan todos los exponentes):

$$P(x) = 2x^3 - x^2 + 0x + 5$$

Coeficientes de $P(x) \rightarrow$	2	-1	0	5
<b>Opuesto del término independiente de <math>D(x) \rightarrow</math></b>	<b>-2</b>	-4	10	-20
	2	-5	10	-15

Una vez que se ordenó y se completó con ceros el polinomio  $P(x)$  se arma el cuadro como se muestra en el ejemplo. El número que se agrega en el ángulo izquierdo (**el  $-2$  en el ejemplo**) es el opuesto de del término independiente del divisor, es decir de  $D(x)$  en nuestro caso.

Luego comienza el procedimiento:

1. Se baja el primer coeficiente de  $P(x)$  (**el 2 en el ejemplo**).
2. Se multiplica dicho coeficiente por el número del ángulo izquierdo (**el  $-2$  en el ejemplo**).
3. Se coloca el resultado de dicha multiplicación en la siguiente columna (**el  $-4$  en el ejemplo**).
4. Se suman los números que quedaron en la primera y en la segunda fila y el resultado se escribe abajo, al lado del número que bajamos en el paso 1. (**el  $-5$  en el ejemplo**).
5. Se repite el procedimiento desde el paso 2 hasta el 4 para cada columna, hasta que se terminen las columnas.

El número recuadrado es el **resto**. Los demás números son los coeficientes del resultado de la división (**Cociente**), que será un polinomio de un grado menos que  $P(x)$ . En el ejemplo anterior el polinomio  $P(x)$  es de grado 3 y por lo tanto el resultado de la división es un polinomio de grado 2.

**El resultado y el resto de la división son:**

$$C(x) = 2x^2 - 5x + 10 \qquad R(x) = -15$$

### Teorema del Resto

Dado un polinomio  $P(x)$  cualquiera y otro polinomio de la forma  $(x - a)$ , **el resto** de la división  $P(x) \div (x - a)$  es igual al valor numérico  $P(a)$ .

Es decir que podemos saber cuál es el resto de una división sin necesidad de realizar dicha operación, simplemente calculando un valor numérico del polinomio  $P(x)$ .

Ejemplo:

El resto de la división  $(2x^3 - x^2 + 5) \div (x + 2)$  se puede calcular encontrando el valor numérico  $P(-2)$ :

$$P(-2) = 2(-2)^3 - (-2)^2 + 5 = 2(-8) - (4) + 5 = -15$$

Por lo tanto podemos afirmar que el resto de la división de  $P(x) = 2x^3 - x^2 + 5$  dividido  $D(x) = x + 2$  es  $R(x) = -15$ , tal como nos había dado al realizar la división con la Regla de Ruffini en el ejemplo anterior.

**OBSERVACIÓN:** Si  $a$  es raíz de  $P(x)$  quiere decir que  $P(a) = 0$ , pero además por el **Teorema del Resto** sabemos que  $P(a)$  es el resto de la división  $P(x) \div (x - a)$ , por lo tanto podemos afirmar que:

$$\text{Si } a \text{ es raíz de } P(x) \Rightarrow P(x) \text{ es divisible por } (x - a)$$

Esto es de gran utilidad porque permite escribir a  $P(x)$  como producto de factores más simples\* de la forma:

$$P(x) = (x - a) \cdot C(x)^*$$

Entonces se dice que  $P(x)$  es **divisible por**  $(x - a)$  o, lo que es lo mismo, que  $P(x)$  es **múltiplo de**  $(x - a)$ .

Ejemplo:

Dado  $P(x) = x^3 + 4x + 16$  se puede verificar que  $a = -2$  es raíz de  $P(x)$ , utilizando la definición de raíz de un polinomio vista antes:

$$P(-2) = (-2)^3 + 4(-2) + 16 = 0$$

Como el **valor numérico**  $P(a) = 0$ , entonces podemos afirmar que **-2 es raíz de**  $P(x)$  y podemos reescribirlo como:

$$P(x) = x^3 + 4x + 16 = (x + 2)(x^2 - 2x + 8)$$

---

\*Aquí con *más simples* nos referimos a polinomios de menor grado.

\*Donde  $C(x)$  es el resultado de la división  $P(x) \div (x - a)$ .

**Generalizando:**

Si conocemos todas las raíces de un polinomio, entonces se puede utilizar el procedimiento del ejemplo anterior de manera repetida y así escribir  $P(x)$  como el producto de factores primos\*.

Es decir:

Dados  $P(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$  y sus raíces  $b_1, b_2$  y  $b_3$ :

$$P(x) = a_3 (x - b_1) (x - b_2) (x - b_3)^*$$

Factorización

Este procedimiento se conoce como factorización de un polinomio

**1.2. Factorización**

**Factorizar** un Polinomio, o una expresión algebraica en general, consiste en escribirlo como producto de polinomios **más sencillos**.

Ejemplos:

El Polinomio  $2x^2 + 4ax$  se puede escribir como  $2x(x + 2a)$ .

Existen varios métodos para factorizar expresiones algebraicas, los mismos se conocen como **casos de Factoreo**. Aquí repasaremos los más utilizados.

**I. Factor Común:**Factor  
Común

Este caso consiste en extraer los factores comunes que están en todos los términos, es decir los aquellos elementos que se encuentran *multiplicando* en todos los términos.

$$ax^2 + abx = ax(x + b)$$

Ejemplos:

$$x^3 + 2x^2 = x^2(x + 2)$$

$$7x^3 - 49x^2 = 7x^2(x - 7)$$

**II. Factor Común por Grupos:**Factor  
Común  
por Grupos

Este caso sirve para cuatrinomios\* en los que haya factores comunes en algunos términos (pero ninguno de ellos se encuentre en todos los términos). El método consiste en extraer un factor común de dos términos y otro factor común de otros dos términos, si la expresión que queda nuevamente tiene un factor que se pueda extraer entonces se repite el procedimiento.

\*El concepto de factores primos es exactamente el mismo que el que estudiamos para los números enteros.

\*En este caso se utilizó esta propiedad para un polinomio de grado 3 y sus tres raíces, pero podría generalizarse aún más para polinomios de otros grados, sin importar qué tan grandes sean.

\*En realidad puede generalizarse para polinomios que tengan un número par de términos.

$$\underbrace{x^2 + ax}_{x \text{ factor común}} + \underbrace{bx + ab}_{b \text{ factor común}} = \underbrace{x(x+a) + b(x+a)}_{(x+a) \text{ factor común}} = (x+a)(x+b)$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 2xy - 4y + 6x - 12 &= 2y(x-2) + 6(x-2) \\ &= (x-2)(2y-6) \end{aligned}$$

### III. Trinomio Cuadrado Perfecto

Se llama trinomio cuadrado perfecto a un polinomio de tres términos (*trinomio*) que se obtiene al desarrollar el cuadrado de un binomio. Este resultado se puede utilizar para factorizar algunos trinomios de segundo grado.

**Trinomio  
Cuadrado  
Perfecto**

$$\begin{aligned} (x+a)^2 &= (x+a)(x+a) \\ &= x^2 + ax + ax + a^2 \\ &= x^2 + 2ax + a^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x-a)^2 &= (x-a)(x-a) \\ &= x^2 - ax - ax + a^2 \\ &= x^2 - 2ax + a^2 \end{aligned}$$

Ejemplo:

$$x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2 \cdot 5 \cdot x + 5^2 = (x+5)^2$$

### IV. Cuatrinomio Cubo Perfecto

Se llama cuatrinomio cubo perfecto al polinomio de cuatro términos (*cuatrinomio*) que se obtiene al desarrollar el cubo de un binomio. Este resultado se puede utilizar para factorizar algunos cuatrinomios de tercer grado.

**Cuatrinomio  
Cubo  
Perfecto**

$$\begin{aligned} (x+a)^3 &= (x+a)^2(x+a) \\ &= (x^2 + 2ax + a^2)(x+a) \\ &= x^3 + ax^2 + 2ax^2 + 2a^2x + a^2x + a^3 \\ &= x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x-a)^3 &= (x-a)^2(x-a) \\ &= (x^2 - 2ax + a^2)(x-a) \\ &= x^3 - ax^2 - 2ax^2 + 2a^2x + a^2x - a^3 \\ &= x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3 \end{aligned}$$

Ejemplo:

$$x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = x^3 + 3 \cdot 2 \cdot x^2 + 3 \cdot 2^2 \cdot x + 2^3 = (x+2)^3$$

## V. Diferencia de Cuadrados

Diferencia  
Cubo  
de Cuadrados

Se llama de esta forma a una resta de dos expresiones que están al cuadrado, de la forma  $x^2 - a^2$ . Puede demostrarse que:

$$\begin{aligned}(x + a)(x - a) &= x^2 - \cancel{(ax)} + \cancel{(ax)} - a^2 \\ &= x^2 - a^2\end{aligned}$$

Este resultado se puede utilizar para factorizar algunos binomios de segundo grado.

Ejemplos:

$$b^2 - 9 = (b + 3)(b - 3)$$

$$x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$$

## VI. Factorizar polinomios conociendo una raíz

Factorizar  
conociendo  
una raíz

Como vimos en un ejemplo en la sección anterior, si  $a$  es raíz de  $P(x)$ , entonces  $P(x)$  es divisible por  $(x - a)$  y se puede escribir como:

$$P(x) = (x - a) \cdot C(x)$$

dónde  $C(x)$  es el cociente de la división de  $P(x) \div (x - a)$ .

Ejemplo:

Como  $x = -3$  es raíz del polinomio  $x^3 - 8x + 3$ , entonces se puede factorizar encontrando el resultado de la división:

$$(x^3 - 8x + 3) \div (x + 3)$$

	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>3</b>
<b>-3</b>		<b>3</b>	<b>9</b>	<b>-3</b>
	<b>1</b>	<b>-3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Por lo tanto:

$$x^3 - 8x + 3 = (x + 3)(x^2 - 3x + 1)$$

**Observación:** Si conocemos una raíz  $a$  de un polinomio siempre vamos a poder factorizarlo encontrando el cociente mediante la regla de Ruffini, ya que el divisor siempre será de la forma  $(x - a)$ .

### 1.3. Fracciones algebraicas

Dados dos polinomios  $P(x)$  y  $Q(x)$ , con  $Q(x) \neq 0(x)$  (distinto del polinomio nulo), llamaremos **Fracción Algebraica** a toda expresión de la forma  $\frac{P(x)}{Q(x)}$

**Definición**  
**Fracciones**  
**Algebraicas**

**Observación:** La indeterminada  $x$  puede tomar cualquier valor real siempre y cuando **no anule el denominador**.

Ejemplos de Expresiones Algebraicas:

$$\frac{2x^2 + 1}{x^2 + 2} \quad \frac{-x}{x - 3} \quad (x \neq 3)$$

Existe gran similitud entre las definiciones y operaciones de fracciones algebraicas y números fraccionarios (o números racionales), por eso usaremos para trabajar con este tipo de expresiones algebraicas los mismos principios que utilizamos en operaciones con fracciones, teniendo **especial cuidado en las simplificaciones**.

**Observación:** En general trataremos de factorizar las expresiones algebraicas lo más posible antes de hacer otras operaciones con ellas.

#### 1.3.1. Simplificación de fracciones algebraicas

Fracciones algebraicas equivalentes:

Dos fracciones algebraicas  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  y  $\frac{M(x)}{N(x)}$  son **equivalentes** si representan a una misma fracción algebraica, es decir una de ellas se obtiene de multiplicar el numerador y el denominador por un mismo polinomio, distinto del polinomio nulo.

**Fracciones**  
**Algebraicas**  
**Equivalentes**

Para simplificar una fracción algebraica deberemos factorizar el numerador y el denominador lo más posible. Luego podremos cancelar **factores** iguales que se encuentren tanto en el numerador como en el denominador, pero aclarando que esa simplificación es posible **en caso que dicho factor sea distinto de 0**.

**Simplificación**  
**de fracciones**  
**algebraicas**

Ejemplo:

$$\frac{\overbrace{x^3 + 4x^2 + 4x}^{\text{Factor común}}}{\underbrace{x^2 - 4}_{\text{Dif. de cuadrados}}} = \frac{\overbrace{x(x^2 + 4x + 4)}^{\text{TCP}}}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x(x + 2)^{\cancel{2}}}{(x - 2)\underbrace{(x + 2)}_{\text{si } x+2 \neq 0}}} = \frac{x(x + 2)}{x - 2} \quad \boxed{\text{si } x \neq -2}$$

La expresión obtenida es **equivalente** a la original, pero es más *simple*.

**IMPORTANTE:**

Para que esto sea realmente cierto **se debe añadir la condición  $x \neq -2$** , ya que sin esa aclaración ambas expresiones **¡NO son iguales!**. Observar que la primera expresión no existe en  $x = -2$ , mientras que la expresión simplificada si existe en  $x = -2$ .

### **IMPORTANTE:**

Sólo se pueden simplificar **factores**. Es decir, expresiones que estén **multiplicando** al numerador y al denominador. **De ninguna manera podremos cancelar términos** (algo que esté sumando o restando) del numerador y denominador.

Ejemplo:

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1} \leftarrow \text{¡Está mal simplificado!}$$

### **1.3.2. Suma y Resta de fracciones algebraicas**

**Suma de fracciones algebraicas**

La suma (y resta) de fracciones algebraicas se realizan con el mismo principio que la suma de fracciones (página ??). Al igual que para números fraccionarios, las fracciones algebraicas son fáciles de sumar y restar si tienen igual denominador. En este caso deben sumarse los numeradores de manera directa y dejar el denominador igual.

Ejemplo:

$$\frac{4x^2 + 4x}{x^2 - 4} + \frac{3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{4x^2 + 4x + 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{4x^2 + 7x + 2}{x^2 - 4}$$

### **Suma de fracciones algebraicas de diferente denominador**

Si los polinomios de los denominadores son diferentes, debemos encontrar fracciones algebraicas equivalentes que tengan el mismo denominador, multiplicando numerador y denominador de cada una por un mismo factor.

**Observación:** Aunque cualquier denominador común es válido, las operaciones resultan más sencillas si elegimos de todos los posibles denominadores comunes el de menor grado, es decir el **Mínimo Común Denominador**.

Los pasos que se deben seguir para realizar la suma o resta son:

- 1) Cálculo del denominador común a toda las fracciones.
  - 1° Factorizar todos los polinomios de los denominadores.
  - 2° Multiplicar todos los factores diferentes.
  - 3° Si existen factores con la misma base y distinto exponente, se debe tomar como factor aquel que tenga mayor exponente.

II) Cálculo de las fracciones equivalentes con dicho denominador.

III) Cálculo de la suma o resta.

Ejemplo:

Se desea calcular:  $\frac{3x}{8x^2 - 8} - \frac{x^2}{4x^2 + 8x + 4}$

- Primero se factorizan los denominadores:

$$8x^2 - 8 = 8(x^2 - 1) = 2^3(x - 1)(x + 1)$$

$$4x^2 + 8x + 4 = 4(x^2 + 2x + 1) = 2^2(x + 1)^2$$

- Luego se determina el denominador común:

$$2^3(x + 1)^2(x - 1)$$

- Se encuentran las fracciones equivalentes:

Para ello se debe multiplicar numerador y denominador por el factor que le *falta* al denominador para ser igual al denominador común.

$$\frac{3x}{8x^2 - 8} = \frac{3x}{2^3(x + 1)(x - 1)} = \frac{3x(\mathbf{x + 1})}{2^3(x + 1)(x - 1)(\mathbf{x + 1})} = \frac{3x(x + 1)}{2^3(x + 1)^2(x - 1)}$$

$$\frac{x^2}{4x^2 + 8x + 4} = \frac{x^2}{2^2(x + 1)^2} = \frac{x^2\mathbf{2(x - 1)}}{2^2(x + 1)^2\mathbf{2(x - 1)}} = \frac{2x^2(x - 1)}{2^3(x + 1)^2(x - 1)}$$

- Se realiza la resta:

$$\frac{3x(x + 1)}{2^3(x + 1)^2(x - 1)} - \frac{2x^2(x - 1)}{2^3(x + 1)^2(x - 1)} = \frac{3x(x + 1) - 2x^2(x - 1)}{2^3(x + 1)^2(x - 1)} =$$

$$= \frac{3x^2 + 3x - 2x^3 + 2x}{2^3(x + 1)^2(x - 1)} = \frac{-2x^3 + 3x^2 + 5x}{2^3(x + 1)^2(x - 1)}$$

### 1.3.3. Producto y división de fracciones algebraicas

El producto y división de fracciones algebraicas siguen las mismas reglas que el producto y división de números racionales. Siempre **primero se factorizan** todas las expresiones algebraicas para simplificar de ser posible *antes* de comenzar a operar.

#### IMPORTANTE:

Siempre hay que aclarar cuando es válida dicha simplificación, añadiendo alguna condición del tipo  $x \neq a$  de ser necesario.

Ejemplo:

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{5(x^2 - 1)} \cdot \frac{2x^2 - 2x}{6x^3} = \frac{(x + 1)^{\cancel{2}}}{\underbrace{5(x + 1)}_{\text{si } x \neq -1} \underbrace{(x - 1)}_{\text{si } x \neq 1}} \cdot \frac{\cancel{2}x \cancel{(x - 1)}}{\underbrace{3}_{\text{si } x \neq 0} x^3} = \frac{x + 1}{5} \cdot \frac{1}{3x^2} = \frac{x + 1}{15x^2}$$

Si  $x \neq -1, 1$  y  $0$

## CURSO DE INGRESO 2021 - MATEMÁTICA

### Ejercicios Capítulo 2

**En todos los ejercicios resolver sin usar calculadora, excepto que se aclare lo contrario**

Dados los siguientes polinomios:

$$P_1 = x + 4 \quad P_2 = x - 3 \quad P_3 = x + 2 \quad P_4 = x^2 + 2x \quad P_5 = -3x^2 + 2$$

$$P_6 = x^4 - 4 \quad P_7 = x^3 + 2x^2 \quad P_8 = 3x^4 + 2x^3 - 5x - 1$$

- Calcular los siguientes valores numéricos.
  - $P_1(-1)$
  - $P_1(-1)$
  - $P_5(2)$
  - $P_6(2)$
  - $P_8(-1)$
- ¿Alguno de los números utilizado en el ejercicio 1 es raíz de alguno de los polinomios? Justifiquen sus respuestas.
- Determinar si los número indicados en cada caso corresponden o no a una raíz del polinomio:
  - $P(x) = x^3 - 3x^2 - 18x + 40$  ;  $a = 2$ ,  $b = 0$ ,  $c = -4$
  - $Q(x) = -2x^3 + 10x^2 - 2x + 10$  ;  $a = 0$ ,  $b = -1$ ,  $c = 5$
  - $R(x) = x^2 + 1$  ;  $a$  : cualquier número real.
- Resolver las siguientes sumas y restas de Polinomios:
  - $P_4 + P_5$
  - $P_8 + P_6$
  - $P_7 - P_8$
- Resolver los siguientes productos de polinomios:
  - $P_1 \cdot P_2$
  - $P_2 \cdot P_4$
  - $P_4 \cdot P_7$
- Encontrar el cociente y el resto mediante la regla de Ruffini de las siguientes divisiones de polinomios:
  - $P_6/P_2$
  - $P_5/P_1$
  - $P_7/P_3$
- Calcular, usando el teorema del resto, el resto de las divisiones del ejercicio 5.
- Indicar cuáles de los siguientes polinomios son divisibles por  $(x - 2)$ . Justificar indicando qué método se utilizó para responder.

- a)  $P(x) = x^4 + 16$       b)  $P(x) = x^3 + 8$       c)  $P(x) = -4x + x^2 + 4$   
 d)  $P(x) = x^3 - 8$

9. Factorizar sacando factor común.

- a)  $2x^2 + 4xy - 6x^3$       b)  $6x^2y - 9x^2y^2 + 12xy$   
 c)  $12a^2 + 18a^3 - 24a^4$       d)  $2t^2 + 100t^3$

10. Factorizar sacando factor común por grupos.

- a)  $x^2 + 4x + xy + 4y$       b)  $xy^2 - 2xy + 3y - 6$   
 c)  $x^4 - x^3 + x^2 + x^2y - xy + y$

11. Decidir cuales de los siguientes son trinomios cuadrados perfectos y factorizarlos.

- a)  $x^2 + 2xy + y^2$       b)  $x^2 + 2x + b^2$       c)  $z^2 + zy + y$   
 d)  $36 + 12y + y^2$       e)  $x^2 - 2xy + y^2$       f)  $x^2 - 8x + 16$

12. Factorizar los siguientes cuatrinomios cubos perfectos.

- a)  $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$       b)  $x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{1}{8}$       c)  $x^9 - 3x^6 + 3x^3 - 1$   
 d)  $x^6 + \frac{1}{27} + x^4 + \frac{1}{3}x^2$

13. Factorizar utilizando diferencia de cuadrados

- a)  $x^2 - 100$       b)  $x^2 - \frac{1}{36}$       c)  $4x^2 - 25$       d)  $t^4 - 4$       e)  $y^8 - 64$

14. Factorizar teniendo en cuenta que  $a$  es raíz de los polinomios

- a)  $x^3 + 27$      $a = -3$       b)  $x^5 - 32$      $a = 2$       c)  $27x^3 - 1$      $a = 1/3$

15. Factorizar las siguientes expresiones combinando los casos anteriores

- a)  $8x^2 + 16xy + 8y^2$       b)  $xa^2 - 2xab + xb^2$       c)  $x^5 - x$   
 d)  $x^2 - 25$       e)  $3x^4 - 9x^3 + 9x^2 - 3x$       f)  $4x^2 + 6xy - 6x - 9y$   
 g)  $a^2x^2 - b^2y^2$       h)  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$     sabiendo que  $a = 1$  es raíz  
 i)  $x^2 + x - 6$     sabiendo que  $a = -3$  es raíz

16. Factorizar y simplificar las siguientes expresiones

- a)  $\frac{24x^2}{12x^3}$       b)  $\frac{2x}{4x^2 + x}$       c)  $\frac{xy - y^2}{x^2 - y^2}$       d)  $\frac{9 + 6x + x^2}{9 - x^2}$   
 e)  $\frac{3y^2 + 9y}{y^2 + y - 6}$

17. Encontrar el mínimo común múltiplo entre las expresiones algebraicas dadas para cada caso.

- a)  $(x - 4)$ ;  $(x + 2)$ ;  $(x^2 - 2x)$   
 b)  $(2x - 6)$ ;  $(x^2 - 6x + 9)$ ;  $(3x - 9)$   
 c)  $(9x^2 - 1)$ ;  $(3x - 1)$ ;  $(3x + 1)$

18. Resolver.

a)  $\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-2}$       b)  $\frac{2}{x^2-4} + \frac{1}{x+2}$       c)  $\frac{x}{x^2-6x+9} + \frac{2}{x^2-9}$

19. Simplificar y resolver.

a)  $\frac{x^2 - 4x + 4}{2x} \cdot \frac{6x - 12}{x^3 - 6x^2 + 12x - 8}$       b)  $\frac{7x}{x^3 - x} \cdot \frac{x - 1}{x + 5} \cdot \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$   
 c)  $\frac{x - 6}{x^2 - 25} \cdot \frac{x + 5}{x^2 - 6x}$       d)  $\frac{y^2 - 4}{y^2 - 9} \div \frac{y - 3}{y + 3}$       e)  $\frac{x + 1}{7 - x} \div \frac{x^2 - 1}{x^2 - 49}$

f)  $\frac{z^2 + 4z + 4}{x} \div \frac{z^2 - 4}{zx - 2x}$

20. Resolver.

a)  $\left(\frac{2}{x+1} \div \frac{1}{x}\right) \frac{x^2 - 1}{x}$       b)  $\frac{1}{z} + \frac{2}{z+1} \cdot \frac{z^2 - 1}{z}$   
 c)  $\left(\frac{1}{y+2} - \frac{1}{y-2}\right) \div \frac{4}{y^2 - 4}$

## CURSO DE INGRESO 2021 - MATEMÁTICA

### Respuestas de los Ejercicios del Capítulo 2

1. a) 3                      b) 0                      c) -10                      d) 12                      e) 5
2. Si  $x = -2$  es raíz de  $P_4(x)$ , porque se cumple que  $P_3(-2) = 0$
3. a)  $a = 2$  : es raíz de  $P(x)$ , ya que  $P(2) = 0$   
     $b = 0$  : no es raíz de  $P(x)$ , ya que  $P(0) \neq 0$   
     $c = -4$  : es raíz de  $P(x)$ , ya que  $P(-4) = 0$   
    b)  $a = 0$  : no es raíz de  $P(x)$ , ya que  $P(0) \neq 0$   
     $b = -1$  : no es raíz de  $P(x)$ , ya que  $P(0) \neq 0$   
     $c = 5$  : es raíz de  $P(x)$ , ya que  $P(5) = 0$   
    c)  $a \in \mathbb{R}$  no es raíz de  $P(x)$ , ya que  $P(a) = a^2 + 1 \neq 0 \forall a \in \mathbb{R}$
4. a)  $-2x^2 + 2x + 2$                       b)  $4x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 5$                       c)  $-3x^4 - x^3 + 2x^2 - 5x - 1$
5. a)  $x^2 + x - 12$                       b)  $x^3 - x^2 - 6x$                       c)  $x^5 + 4x^4 - 4x^3$
6. a)  $C(x) = x^3 + 3x^2 + 9x + 27$  ;  $R(x) = 77$   
    b)  $C(x) = -3x + 12$  ;  $R(x) = -46$   
    c)  $C(x) = x^2$  ;  $R(x) = 0$
7. a)  $R(x) = P_6(3) = 77$                       b)  $R(x) = P_5(-4) = -46$                       c)  $R(x) = P_7(-2) = 0$
8. a) No es divisible por  $(x - 2)$ , ya que  $P(2) \neq 0$   
    b) Es divisible por  $(x - 2)$ , ya que  $P(2) = 0$   
    c) Es divisible por  $(x - 2)$ , ya que  $P(2) = 0$   
    d) Es divisible por  $(x - 2)$ , ya que  $P(2) = 0$
9. a)  $2x(x + 2y - 3x^2)$                       b)  $3xy(2x - 3xy + 4)$                       c)  $6a^2(2 + 3a - 4a^2)$   
    d)  $2t^2(1 + 50t)$
10. a)  $(x + 4)(x + y)$                       b)  $(y - 2)(xy + 3)$                       c)  $(x^2 - x + 1)(x^2 + y)$
- 11.

- a)  $(x + y)^2$                       b) No es TCP                      c) No es TCP  
d)  $(6 + y)^2$                       e)  $(x - y)^2$                       f)  $(x - 4)^2$
12. a)  $(x - 2)^3$                       b)  $(x + \frac{1}{2})^3$                       c)  $(x^3 - 1)^3$                       d)  $(x^2 + \frac{1}{3})^3$
13. a)  $(x - 10)(x + 10)$                       b)  $(x - \frac{1}{6})(x + \frac{1}{6})$                       c)  $(2x - 5)(2x + 5)$   
d)  $(t^2 - 2)(t^2 + 2)$                       e)  $(y^4 - 8)(y^4 + 8)$
14. a)  $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$                       b)  $(x - 2)(x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16)$   
c)  $(x - \frac{1}{3})(27x^2 + 9x + 3)$
15. a)  $8(x + y)^2$                       b)  $x(a - b)^2$                       c)  $x(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$   
d)  $(x - 5)(x + 5)$                       e)  $3x(x - 1)^3$                       f)  $2(x - \frac{3}{2})(2x + 3y)$   
g)  $(ax - by)(ax + by)$                       h)  $(x - 3)(x + 2)(x - 1)$                       i)  $(x + 3)(x - 2)$
16. a)  $\frac{2}{x}$  (si  $x \neq 0$ )                      b)  $\frac{2}{4x + 1}$  (si  $x \neq 0$ )                      c)  $\frac{y}{x + y}$  (si  $x \neq y$ )  
d)  $\frac{3 + x}{3 - x}$  (si  $x \neq -3$ )                      e)  $\frac{3y}{y + 2}$  (si  $x \neq -3$ )
17. a) MCM:  $x(x + 2)(x - 2)$                       b) MCM:  $6(x - 3)^2$                       c) MCM:  $(3x - 1)(3x + 1)$
18. a)  $\frac{-4}{(x + 2)(x - 2)}$                       b)  $\frac{x}{(x + 2)(x - 2)}$                       c)  $\frac{(x - 1)(x + 6)}{(x - 3)^2(x + 3)}$
19. a)  $\frac{3}{x}$  (si  $x \neq 2$ )                      b)  $\frac{7}{(x - 1)(x + 5)}$  (si  $x \neq 0$ ,  $x \neq 1$  y  $x \neq -1$ )  
c)  $\frac{1}{x(x - 5)}$  (si  $x \neq 6$  y  $x \neq -5$ )                      d)  $\frac{(y - 2)(y + 2)}{(y - 3)^2}$  (si  $y \neq -3$ )  
e)  $-\frac{x + 7}{x - 1}$  (si  $x \neq 7$  y  $x \neq -1$ )                      f)  $z + 2$  (si  $x \neq 0$ ,  $z \neq 2$  y  $z \neq -2$ )
20. a)  $2(x - 1)$  (si  $x \neq 0$  y  $x \neq -1$ )                      b)  $\frac{2z - 1}{z}$  (si  $z \neq -1$ )  
c)  $-1$  (si  $y \neq 2$  e  $y \neq -2$ )



Facultad de  
Ciencias Agrarias  
y Forestales



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

# CURSO DE INGRESO 2021

## Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

# MATEMÁTICA

## Capítulo 3

Material de apoyo para el curso de Nivelación de Matemática para los ingresantes a las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.

# Índice

<b>1. Ecuaciones</b>	<b>3</b>
1.1. Definición . . . . .	3
1.2. Resolución de ecuaciones . . . . .	4
1.3. Ecuaciones lineales . . . . .	5
1.4. Ecuaciones cuadráticas . . . . .	6
1.5. Sistemas de ecuaciones lineales . . . . .	9

# 1. Ecuaciones

## Actividad Inicial

*A un criado se le ha prometido la suma de 100 pesos más una capa como sueldo anual. Al cabo de 7 meses el criado se va, y recibe como pago total la capa y 20 pesos ¿Cual será el precio de la capa?.*

- 1) Discutan en grupo: ¿pueden calcular el precio de la capa de manera intuitiva? ¿cómo?
- 2) ¿Cómo plantearía de una forma más formal el problema?
- 3) Designen como  $x$  al precio de la capa (valor desconocido que se desea encontrar)
- 4) Escriban una expresión que represente la el sueldo correspondiente a **un mes** de trabajo.
- 5) Ahora busquen una nueva expresión que represente el sueldo correspondiente a **siete meses de trabajo** e igualenlo a la cantidad que recibió el criado.

El resultado obtenido es una igualdad en la que aparece una incógnita  $x$ , dónde  $x$  es el valor de la capa que deseamos encontrar. El problema ha quedado reducido a encontrar un número  $x$  que verifique dicha igualdad.

Este tipo de expresiones se llaman **ecuaciones** y para su obtención hemos operado con  $x$  como si fuera un número cualquiera.

### 1.1. Definición

Una es una relación de igualdad entre cantidades, algunas de ellas desconocidas, a las que llamaremos **incógnitas**.

Ejemplos de Ecuaciones:

$$5x + 2y = 3 \qquad \frac{1}{9}x^2 - 1 = 0 \qquad 3 + \frac{x+1}{2} = x$$

El origen de las ecuaciones debe verse en ciertos problemas surgidos tanto de una situación de interés real como planteados para entretenimiento; ambos casos poseen remotos antecedentes históricos. El afán por resolver estos problemas, ya sea por necesidad o como diversión, llevó paulatinamente a la idea fundamental: introducir cantidades desconocidas y someterlas a las leyes de la aritmética, considerando que son números a conocer.

Más allá de cómo se hayan originado las ecuaciones, está claro que una vez que contamos con ellas, es de interés conocer métodos que permitan resolver las ecuaciones, de algunos de ellos nos encargaremos en este capítulo.

## 1.2. Resolución de ecuaciones

### Definición 1:

**Solución de una Ecuación**

Las **soluciones** de una ecuación son todos los números reales  $a$ ,  $b$ ,  $c...$  que al reemplazarlos por la incógnita en la ecuación verifican la igualdad.

Ejemplo:

Dada la ecuación  $x^2 - 2x = 3$ , podemos comprobar que los valores  $a = 3$  y  $b = -1$  son soluciones de la ecuación, ya que:

$$\text{Para } a = 3: \quad 3^2 - 2 \cdot 3 = 9 - 6 = 3 \quad \implies \text{ se verifica la igualdad}$$

$$\text{Para } b = -1: \quad (-1)^2 - 2 \cdot (-1) = 1 + 2 = 3 \quad \implies \text{ se verifica la igualdad}$$

De esta forma comprobamos que  $a = 3$  y  $b = -1$  son soluciones de la ecuación dada.

**Actividad:** Decidir si  $a$  y  $b =$  son soluciones de las ecuaciones:

$$2x + 4 = 12 \quad ; \quad \text{con } a = 4 \quad \text{y } b = 2$$

$$4x^2 + 2x = 120 \quad ; \quad \text{con } a = 10 \quad \text{y } b = 12$$

### Definición 2:

**Ecuaciones Equivalentes**

Dos o más ecuaciones se llaman **ecuaciones equivalentes** si tienen las mismas soluciones.

### ¿Qué significa resolver una ecuación?

Resolver una ecuación significa determinar si tiene solución/es y en tal caso hallar todas las soluciones.

### ¿Cómo puede resolverse una ecuación?

El procedimiento para resolver una ecuación está basado en la idea de que la incógnita es un número desconocido que se quiere identificar.

Es decir que básicamente una ecuación es una igualdad entre números; y por lo tanto son válidas todas las propiedades estudiadas en el capítulo 1.

En definitiva el procedimiento para resolver una ecuación consiste en transformar la ecuación en otra equivalente, pero cuya resolución sea más sencilla.

### ¿Cómo puede obtenerse una ecuación equivalente?

**Reglas para la obtención de ecuaciones equivalentes**

- 1° **Sumando o restando a ambos miembros de una una misma cantidad.**
- 2° **Multiplicando o dividiendo ambos miembros, de una por una misma cantidad no nula.**

Ejemplo:

$$\begin{array}{ll} \text{Sea la ecuación:} & 3x + 1 = 2 - x \\ \text{Sumando } x \text{ a ambos miembros:} & 4x + 1 = 2 \\ \text{Restando 1 de ambos miembros:} & 4x = 1 \\ \text{Dividiendo por 4 ambos miembros:} & x = \frac{1}{4} \end{array}$$

Por lo tanto  $x = \frac{1}{4}$  es la solución de la ecuación original. Lo que hemos hecho es transformar sucesivamente la con el fin de **despejar** la incógnita.

### 1.3. Ecuaciones lineales

**Definición:**

Se llaman **ecuaciones lineales** a las ecuaciones en donde la incógnita se encuentra elevada a la potencia 1. Es decir, ecuaciones de la forma:

**Ecuaciones  
Lineales**

$$ax = b$$

O una equivalente ella.

**¿Cuántas soluciones tiene una ecuación lineal de una incógnita?**

Las ecuaciones lineales pueden tener **una única solución**, **infinitas soluciones** o no tener **ninguna solución**.

Ejemplos:

#### I. Solución única:

$$\begin{array}{ll} -3x = 2(x - 1) + 4 & \\ -3x = 2x - 2 + 4 & \longrightarrow \text{aplicando distributiva} \\ -3x - 2x = -2 + 4 & \longrightarrow \text{agrupando las } x \\ -5x = 2 & \longrightarrow \text{operando} \\ x = -2/5 & \implies x = -2/5 \text{ es la solución de la ecuación} \end{array}$$

#### II. Infinitas Soluciones:

$$\begin{array}{ll} 3x - 10 = 2(3x - 5) - 3x & \\ 3x - 10 = 6x - 10 - 3x & \longrightarrow \text{aplicando distributiva} \\ 3x - 10 = 3x - 10 & \longrightarrow \text{operando} \\ 3x - 3x = -10 + 10 & \longrightarrow \text{agrupando las } x \\ 0 = 0 & \implies \text{Válido para cualquier valor de } x \end{array}$$

La ecuación equivalente obtenida  $0 = 0$  se verifica independientemente del valor que tome  $x$ , y por lo tanto se puede afirmar que **la ecuación tiene infinitas soluciones**.

### III. Sin solución:

$$\begin{aligned}
 -3x - 8 &= 2(x - 1) - 5x \\
 -3x - 8 &= 2x - 2 - 5x && \longrightarrow \text{aplicando distributiva} \\
 -3x - 8 &= 3x - 2 && \longrightarrow \text{operando} \\
 -3x + 3x &= -2 + 8 && \longrightarrow \text{agrupando las } x \\
 0 &= 6 && \implies \text{Contradicción o absurdo}
 \end{aligned}$$

La ecuación equivalente obtenida en este caso es una absurdo (el número 6 no es igual a 0). Y no existe ningún número que reemplazado por  $x$  en la ecuación cambie esta situación, por lo tanto **la ecuación no tiene solución**.

## 1.4. Ecuaciones cuadráticas

### Definición

**Ecuaciones  
Cuadráticas**

Se llaman **ecuaciones cuadráticas** las ecuaciones en donde la incógnita se encuentra elevada al cuadrado. Es decir, ecuaciones de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad \text{con } a \neq 0$$

o cualquier otra ecuación equivalente a ella.

**Actividad:** Discutan con sus compañeros ¿por qué creen que en la definición anterior aparece la condición  $a \neq 0$ ?

**Coefficientes**

Los números reales  $a$ ,  $b$  y  $c$  se llaman **coeficientes** y son respectivamente el coeficiente del término cuadrático, el coeficiente del término lineal y el coeficiente del término independiente.

### ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática de una incógnita?

Las ecuaciones cuadráticas pueden tener **dos soluciones**, **una única solución**, **infinitas soluciones** o no tener **ninguna solución**.

### Métodos de resolución

Comencemos viendo como se resuelven ciertas ecuaciones de segundo grado sencillas, para luego analizar algunos métodos de resolución más generales.

#### I. Ecuaciones cuadráticas sin término lineal:

**Ecuación  
Cuadrática  
sin Término  
Lineal**

Son de la forma:

$$ax^2 + c = 0$$

Estas ecuaciones se pueden resolver por simple despeje, prestando mucha atención a las propiedades de la potencia.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}
3x^2 - 12 &= 0 \\
3x^2 &= 12 &\longrightarrow &\text{Pasamos sumando el 12} \\
x^2 &= 4 &\longrightarrow &\text{Despejamos } x^2 \text{ pasando dividiendo el 3} \\
\sqrt{x^2} &= \sqrt{4} &\longrightarrow &\text{Aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad} \\
|x| &= 2 &\longrightarrow &\text{Por propiedad de simplificación de raíz y potencia} \\
x = 2 \quad \text{ó} \quad x = -2 &\longrightarrow &&\text{Por definición de valor absoluto}
\end{aligned}$$

La ecuación tiene dos soluciones:  $x_1 = 2$  y  $x_2 = -2$ .

## II. Ecuaciones cuadráticas sin término independiente:

Son de la forma:

$$a x^2 + b x = 0$$

Ecuación  
Cuadrática  
sin Término  
Independiente

Para resolver este tipo de ecuaciones se debe **sacar factor común**  $x$ , para convertir la ecuación a la forma:

$$x \cdot (a x + b) = 0$$

Considerando que **si un producto de dos o más números da 0, entonces uno de ellos debe valer 0**. Puede decirse que:

$$x = 0 \quad \text{o bien} \quad (a x + b) = 0 \quad \implies \quad x_1 = 0 ; x_2 = -\frac{b}{a}$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned}
x^2 + 4x &= 0 \\
x(x + 4) &= 0 &\longrightarrow &\text{Sacamos factor común } x \\
(x + 4) = 0 \quad \text{ó} \quad x = 0 &\longrightarrow &&\text{Utilizamos la propiedad del producto } = 0 \\
x = -4 \quad \text{ó} \quad x = 0 &\longrightarrow &&\text{Resolvemos ambas ecuaciones lineales}
\end{aligned}$$

Las dos soluciones de la ecuación son:  $x_1 = -4$  y  $x_2 = 0$ .

**Observación Importante:** Se debe tener cuidado al resolver este tipo de ecuaciones de **no perder soluciones** durante el despeje. Por ejemplo uno podría haber comenzado a resolver de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
x^2 &= -4x &\longrightarrow &\text{Dividimos ambos miembros por } x \\
x &= -4 &\implies &\text{Se obtuvo una sola solución}
\end{aligned}$$

De esta forma se obtiene una sola solución, lo que claramente está mal.

El error se comete al pasar dividiendo la  $x$  sin tener en cuenta que esa  $x$  podría ser 0.

El paso de dividir ambos miembros de la igualdad por un número para obtener una ecuación equivalente es válido solamente si **el número por el que estamos dividiendo es distinto de cero**.

### III. Trinomio cuadrado perfecto (TCP):

Trinomio  
Cuadrado  
Perfecto

Ecuación de la forma:

$$(A x + B)^2 = C^*$$

Para resolver este tipo de ecuaciones se debe aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros y así se obtienen dos ecuaciones lineales de la forma:

$$(A x + B) = \sqrt{C} \quad \text{y} \quad (A x + B) = -\sqrt{C}$$

Que se pueden resolver de manera sencilla.

**Observación:** La mayoría de las veces que nos encontramos con este tipo de ecuaciones, el trinomio cuadrado perfecto está desarrollado, es decir de la forma:

$$a x^2 + b x + c = 0$$

Y por lo tanto se debe realizar un procedimiento llamado **completar cuadrados** para encontrar una ecuación equivalente que sea de la forma propuesta.

La técnica de **completar cuadrados** consiste en sumar a ambos miembros de la igualdad un número *elegido adecuadamente*, para que en uno de los miembros quede un trinomio cuadrado perfecto, es decir una de las expresiones siguientes:

$$x^2 + 2 a x + a^2 = (x + a)^2$$

$$x^2 - 2 a x + a^2 = (x - a)^2$$

Que puede ser reemplazada por su forma factorizada  $(x + a)^2$  o  $(x - a)^2$

Ejemplo:

$$\begin{array}{l} x^2 - 6x + 5 = 0 \quad \xrightarrow{\text{Comparamos el término lineal con el del TCP}} \\ \underbrace{x^2 - 6x + 9}_{(x-3)^2} + 5 = 0 + 9 \quad \xrightarrow{\text{Sumamos 9 en ambos lados de la igualdad}} \\ (x - 3)^2 + 5 = 9 \quad \xrightarrow{\text{Aplicamos el tercer caso de factoro}} \\ (x - 3)^2 = 4 \quad \xrightarrow{\text{Restamos 5 en ambos lados de la igualdad}} \\ \sqrt{(x - 3)^2} = \sqrt{4} \quad \xrightarrow{\text{Aplicamos la raíz cuadrada en ambos miembros}} \\ |(x - 3)^2| = 2 \quad \xrightarrow{\text{Por propiedad de raíces y potencias}} \\ x - 3 = \pm 2 \quad \xrightarrow{\text{Utilizamos la definición de valor absoluto}} \\ x = 3 \pm 2 \quad \xrightarrow{\text{Sumamos 3 a ambos miembros de la igualdad}} \\ x_1 = 5 \quad \text{o} \quad x_2 = 1 \quad \implies \text{Soluciones de la ecuación} \end{array}$$

---

\*Se utilizaron letras mayúsculas para los coeficientes para que no se confundan con los coeficientes de los términos cuadrático e independiente de la forma general de la ecuación dada en la definición.

#### IV. Forma general (Fórmula de Bhaskara):

El método de completación de cuadrados puede generalizarse para resolver cualquier ecuación cuadrática, que sea de la forma:

**Fórmula de Bhaskara**

$$a x^2 + b x + c = 0$$

Si se realiza el procedimiento de completación de cuadrados para esta ecuación, se obtiene la **Fórmula de Bhaskara** que da las soluciones para cualquier ecuación cuadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 a c}}{2 a}$$

### 1.5. Sistemas de ecuaciones lineales

#### Definición 1:

Se llama sistema de ecuaciones a todo conjunto de ecuaciones relacionadas entre sí. Cada una de las ecuaciones puede tener una o más incógnitas.

**Sistema de Ecuaciones**

Ejemplo:

$$\begin{cases} 3x^2 + 5y = 3 \\ 2xy - \frac{1}{y} = 6 \end{cases}$$

#### Definición 2:

Diremos que un sistema de ecuaciones es un **sistema lineal de ecuaciones** si todas las ecuaciones del sistema son lineales.

**Sistema Lineal de Ecuaciones**

Un sistema de dos ecuaciones lineales es de la forma:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

donde  $a, b, c, d, e, f$  son números reales.

Ejemplo de sistema de ecuaciones lineal:

$$\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

#### Definición 3:

Se llama **solución del sistema** a un par de valores  $(x_0, y_0)$  que al reemplazarlos en los valores de  $x$  e  $y$  respectivamente, ambas ecuaciones se verifican simultáneamente.

**Solución del Sistema**

**¿Cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones lineal?**

Al igual que con las ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones lineal puede tener **una única solución**, **infinitas soluciones** o **no tener solución**.

### Métodos de Resolución de Ecuaciones Lineales

## I. Método de Sustitución

### Método de Sustitución

Consiste en despejar una de las incógnitas de una ecuación y reemplazar la expresión obtenida en la otra ecuación.

De esta forma deben resolverse dos ecuaciones lineales de una sola incógnita, como estudiamos en secciones anteriores.

Ejemplo:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - 3y = 6 \end{cases}$$

Despejamos  $x$  de la primera ecuación:

$$x = \frac{12 - 3y}{2} \quad (1)$$

Reemplazamos la expresión en la segunda ecuación:

$$4 \left( \frac{12 - 3y}{2} \right) - 3y = 6$$

Operamos:

$$24 - 6y - 3y = 6$$

$$-9y = 6 - 24$$

$$-9y = -18$$

$$y = 2$$

El valor de  $y$  se reemplaza en (1):

$$x = \frac{12 - 3 \cdot 2}{2} = 3$$

El sistema tiene **una sola solución** que consiste en dos valores, uno correspondiente a la variable  $x$  y el otro a la variables  $y$ . Para expresar el resultado pueden utilizarse dos formas, una es darlo como un par ordenado:  $(3; 2)$ , donde el primer valor dentro del paréntesis corresponde a  $x$  y el segundo a  $y$ . La segunda manera de dar el resultado consiste en dar ambos valores indicando a qué variable corresponde cada uno:  $x_1 = 3; y_1 = 2$ .

## II. Método de igualación

### Método de Igualación

Consiste en despejar la misma incógnita de las dos ecuaciones e igualar ambas ecuaciones resultantes.

De esta forma se obtiene una nueva ecuación lineal de una sola incógnita y se resuelve para obtener el resultado de **una sola de las incógnitas**.

Finalmente se reemplaza el valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones originales y se despeja la otra incógnita.

Ejemplo:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x + 6y = 6 \end{cases}$$

Despejamos  $x$  de las dos ecuaciones:

De la primera ecuación:  $x = \frac{12 - 3y}{2}$

De la segunda ecuación:  $x = \frac{6 - 6y}{4}$

Luego igualamos:

$$\frac{12 - 3y}{2} = \frac{6 - 6y}{4}$$

Operando se obtiene:

$$4(12 - 3y) = 2(6 - 6y)$$

$$48 - 12y = 12 - 12y$$

$$48 = 12 - \cancel{12y} + \cancel{12y}$$

$$48 = 12$$

La última afirmación es lo que en matemática se llama una **contradicción o absurdo** y, como vimos en secciones anteriores, indica que el sistema **no tiene solución**.

## CURSO DE INGRESO 2020 - MATEMÁTICA

### Ejercicios Capítulo 3

**En todos los ejercicios resolver sin usar calculadora, excepto que se aclare lo contrario**

1. Resolver las siguientes ecuaciones (si tienen solución) y, en el caso que existan, verificar las soluciones obtenidas.

a)  $8x + x - 1 = -2x + 1$       b)  $\frac{x}{2} - x = -3x + 1$       c)  $x + 2 = -(3 - x) + 5$

d)  $3(x + 5) = -\frac{3}{4}(-4x + 7)$       e)  $(2 - x)(3 - x) = (1 - x)(5 - x)$

2. Resolver los siguientes problemas.

a) Se sabe que la ecuación :  $(2a - 1)(x + 1) + x = a$ , tiene por solución  $x = -2$ .  
¿Cuál es el valor de  $a$ ?

b) ¿Cuál es el número cuya tercera parte sumada a su quinta parte es igual a 40?

c) Una persona recibe un aumento de 10 % en su salario, alcanzando un ingreso de \$ 13200 mensuales. ¿Cuál era su salario antes del aumento?

d) En una oferta, un local de venta de artículos deportivos redujo el precio de unas zapatillas en un 20 % hasta alcanzar un precio de \$ 1120. ¿Cuál era el precio original?

3. Resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas sin término lineal.

a)  $4x^2 - 1 = 0$       b)  $x^2 = 9$       c)  $10x^2 + 1 = x^2 + 2$

4. Resolver las siguientes ecuaciones cuadráticas sin término independiente.

a)  $x^2 - 3x = 0$       b)  $x^2 = -9x$       c)  $10x^2 + 2x + 2 = 2(x^2 + 1)$

5. Resolver las siguientes ecuaciones, utilizando el método de completación de cuadrados.

a)  $x^2 + 4x + 3 = 0$       b)  $x^2 - 16x + 39 = 0$       c)  $x^2 - 10x + 10 = 1$

6. Resolver las siguientes ecuaciones utilizando la fórmula de Bhaskara.

a)  $x^2 - 3x - 70 = 0$       b)  $5(1 - x^2) = -10(x + 1)$

c)  $-2x^2 - 2x - 10 = 0$

7. Resolver las siguientes mediante el método más conveniente.

a)  $(2x + 3)(2x - 3) = 9(x - 1)$

b)  $3x^2 + 3 - 5x = x + 2x^2 - 6$

c)  $12x^2 + 15x = 18$

d)  $x^2 + (x + 1)^2 + (x + 2)^2 = 365$

e)  $3(x - 6)^2 = 48$

f)  $2x^2 - 8 = 0$

g)  $x^2 - 3x = 0$

8. Resolver los siguientes problemas

a) Hallar el/los números tales que su cuadrado sea igual a su opuesto.

b) ¿Cuál es el número natural tal que la mitad del producto por su consecutivo es igual a 15?

c) La superficie de un rectángulo es de  $108 \text{ cm}^2$ . Sabiendo que uno de los lados es igual a los  $\frac{4}{3}$  del otro, calcular las dimensiones del rectángulo.

d) La superficie de un triángulo es de  $60 \text{ cm}^2$ . ¿Cuánto mide la altura, sabiendo que tiene 2 cm más que la base?

e) Calcular el/los números que sumados a su cuadrado dan como resultado treinta.

f) Encontrar tres números naturales consecutivos cuyos cuadrados sumen 77.

9. Resolver las siguientes sistemas mediante el método de sustitución. Verificar la solución obtenida.

a) 
$$\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} -x + 3y = -2 \\ 3x - 2 = x + 6y + 2 \end{cases}$$

10. Resolver las siguientes sistemas mediante el método de igualación. Verificar la solución obtenida.

a) 
$$\begin{cases} 3x - 2y = 3 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} x - 2y = -3 \\ -3x = 1 - 6y \end{cases}$$

11. Resolver los siguientes problemas


a) La suma de dos números es 28 y su diferencia 6. Calcular dichos números.

b) Una botella y su corcho cuestan \$45 y la botella cuesta \$39 más que el corcho. ¿Cuánto cuesta la botella y cuánto el corcho?

c) En un corral hay entre pollos y cabritos 23 animales; si se cuentan 60 patas. ¿Cuántos pollos y cuántos cabritos hay?

d) Por un par de zapatos se paga el triple que por una corbata, gastando en total por los dos artículos \$2400. Calcular el costo de cada uno.


## Anexo: Algunos perímetros, áreas y volúmenes útiles



Rectángulo

Área  $A = a b$


Perímetro  $P = 2a + 2b$



Circunferencia

Área  $A = \pi r^2$


Perímetro  $P = 2\pi r$



Triángulo

Área  $A = (ah) / 2$


Perímetro  $P = a + b + c$



Paralelepípedo rectangular recto

Área exterior  $A = 2ab + 2ac + 2bc$


Volumen  $V = abc$



Cilindro

Área exterior  $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$

Volumen  $V = \pi r^2 h$



Esfera

Área exterior  $A = 4\pi r^2$

Volumen  $V = 4/3 \pi r^3$

## CURSO DE INGRESO 2021 - MATEMÁTICA

### Respuestas de los Ejercicios del Capítulo 3

1. a)  $x = \frac{2}{11}$                       b)  $x = \frac{2}{5}$                       c) Infinitas soluciones  
d) No tiene solución              e)  $x = -1$
2. a)  $a = -1/3$   
b) El número es 75.  
c) El salario antes del aumento era de \$ 12.000.  
d) El precio original de las zapatillas era de \$ 1400.
3. a)  $x_1 = -1/2$     $x_2 = 1/2$     b)  $x_1 = 3$     $x_2 = -3$               c)  $x_1 = 1/3$     $x_2 = -1/3$
4. a)  $x_1 = 0$     $x_2 = 3$               b)  $x_1 = 0$     $x_2 = -9$               c)  $x_1 = 0$     $x_2 = -1/4$
5. a)  $x_1 = -1$     $x_2 = -3$               b)  $x_1 = 13$     $x_2 = 3$               c)  $x_1 = 9$     $x_2 = -1$
6. a)  $x_1 = 10$     $x_2 = -7$               b)  $x_1 = -1$     $x_2 = 3$               c) No tiene solución en  $\mathbb{R}$
7. a)  $x_1 = 0$     $x_2 = \frac{9}{4}$               b)  $x = 3$                       c)  $x_1 = 3/4$     $x_2 = -1$   
d)  $x_1 = 10$     $x_2 = -12$               e)  $x_1 = 10$     $x_2 = 2$               f)  $x_1 = 2$     $x_2 = -2$   
g)  $x_1 = 0$     $x_2 = 3$
8. a) Los números son 0 y -1.  
b) El número es 5.  
c) Los lados del rectángulo miden 9 *cm* y 12 *cm*.  
d) La altura del triángulo es de 12 *cm*.  
e) Los números son 5 y -6.  
f) Los números son 4, 5 y 6.
9. a) (1, 2)                                      b)  $(3\alpha + 2, \alpha)$  para cualquier  $\alpha \in \mathbb{R}$
- 10.

a)  $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{2}\right)$

b) El sistema no tiene solución

11. a) Los números son 17 y 11.  
b) La botella cuesta \$42 y el corcho \$3.  
c) En el corral hay 16 pollos y 7 cabritos.  
d) Los zapatos cuestan \$1,800 y la corbata \$600.



Facultad de  
Ciencias Agrarias  
y Forestales



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

# CURSO DE INGRESO 2021

## Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

# MATEMÁTICA

## Capítulo 4

Material de apoyo para el curso de Nivelación de Matemática para los ingresantes a las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.

## Índice

<b>1. Rectas en el plano coordenado</b>	<b>3</b>
1.1. Coordenadas rectangulares en el plano . . . . .	3
1.2. Rectas en el plano . . . . .	3
1.2.1. Ecuación de la Recta . . . . .	4
1.2.2. Gráfica de una recta a partir de su ecuación . . . . .	8

# 1. Rectas en el plano coordenado

## 1.1. Coordenadas rectangulares en el plano

Se llama plano coordenado al plano que queda formado al trazar dos rectas perpendiculares, que llamaremos eje  $x$  y eje  $y$ . El punto de intersección entre los dos ejes coordenados se llama origen de coordenadas y se representa como  $O$ .

El plano queda así dividido en cuatro regiones que se llaman **cuadrantes** y que se numeran  $I, II, III, IV$ .


Cada uno de los ejes es la recta de los números reales, y los números se representan sobre ella como vimos en el capítulo 1. Por convención, sobre el eje  $x$  colocamos los positivos a la derecha del cero y los negativos a la izquierda; sobre el eje  $y$ , colocamos los números positivos arriba del 0 y los negativos debajo del 0.

### Punto en el plano:

Para ubicar un punto en el plano coordenado es necesario identificar dos coordenadas (o valores numéricos), una correspondiente a la distancia del punto a  $O$  en la dirección del eje  $x$  y la otra correspondiente a la distancia a  $O$  en la dirección del eje  $y$ .

**Coordenadas de un Punto**

Es decir que a un punto  $P$  del plano debemos asociarle dos números (ordenadamente):  $(x_1, y_1)$ , para poder graficarlo.



Decimos que  $P$  tiene coordenadas  $(x, y)$ , la primera coordenada  $x$  se llama **abscisa** de  $P$  y la segunda se llama **ordenada** de  $P$ . Recíprocamente, dado un par ordenado de números  $(x, y)$  existe un punto  $P$  del plano del cual son las coordenadas.

**Absisa y Ordenada**

## 1.2. Rectas en el plano

La **interpretación geométrica** de las ecuaciones lineales son rectas en el plano, es decir **la gráfica** que representa una ecuación lineal es una recta.

En otras palabras:

- Todos los pares de valores  $(x_1, y_1)^*$  que verifican la ecuación de una recta, representan puntos que pertenecen a la recta y en consecuencia se ubican sobre la gráfica de dicha recta.
- Recíprocamente, todos los puntos que pertenecen a la gráfica de la recta necesariamente verifican la ecuación de dicha recta.

Ejemplo:

Dada la recta  $L$ , de ecuación:  $y = 3x + 2$ , podemos averiguar si los puntos  $P_0(1, 5)$  y  $P_1(2, 7)$  pertenecen a la recta  $L$  corroborando si las coordenadas de dichos puntos **verifican la ecuación de  $L$**  (es decir, son una solución de la ecuación de la recta).

$$\begin{array}{lcl}
 P_0(1, 5) : & y = 3x + 2 & P_1(2, 7) : y = 3x + 2 \\
 & 5 = 3 \cdot 1 + 2 & 7 \neq 3 \cdot 2 + 2 \\
 & 5 = 5 & 7 \neq 8
 \end{array}$$

Es decir que  $P_0$  sí pertenece a la recta  $L$  pero  $P_1$  no.

Ejemplo:

Dada la recta  $L$ , de ecuación  $2y = x + 3$ , para encontrar puntos que pertenezcan a  $L$ , se debe dar un valor arbitrario a una de las variables ( $x$  o  $y$ ) y encontrar el valor de la otra:


$$\begin{array}{lcl}
 \text{Ejemplo 1: } x = 2 : & 2y = x + 3 & \text{Ejemplo 2: } y = 1 : & 2y = x + 3 \\
 & 2y = 2 + 3 & & 2 \cdot 1 = x + 3 \\
 & 2y = 5 & & 2 = x + 3 \\
 & y = \frac{5}{2} & & 2 - 3 = x \\
 & & & -1 = x
 \end{array}$$

Es decir que los puntos  $P_0(2, \frac{5}{2})$  y  $P_1(-1, 1)$  pertenecen a la recta  $L$ .

### 1.2.1. Ecuación de la Recta


Rectas  
paralelas  
al eje  $y$

1. Si  $L$  es **vertical** (paralela al eje  $y$ ), tiene ecuación de la forma:  $x = c$




\*Es común utilizar subíndices en las coordenadas de un punto, por ejemplo  $P_0(x_0, y_0)$ ,  $P_1(x_1, y_1)$ ,  $P_2(x_2, y_2)$ , etc., para indicar que se trata de un punto conocido del plano, es decir **un punto específico del plano**, y en cambio utilizar un punto sin subíndices  $P(x, y)$  para referirnos a un punto genérico, es decir **a cualquier punto del plano**

Ejemplo:  $x = 2$




2. Si  $L$  es **horizontal** (paralela al eje  $x$ ), tiene ecuación de la forma:  $y = c$

**Rectas  
paralelas  
al eje  $x$**



Ejemplo:  $y = 3$



3. Si  $L$  no es **vertical** ni **horizontal**, tiene ecuación de la forma:

**Ecuación  
de la Recta**

$$y = m x + b$$

Los valores  $m$  y  $b$  son la **pendiente** y la **ordenada al origen** respectivamente.

Esta ecuación de la recta se conoce como **ecuación explícita**, pero no es la única forma en que se puede encontrar la ecuación de una recta. Cualquier ecuación con dos variables ( $x$  e  $y$ ) que sea lineal en  $x$  y lineal en  $y$ , es la ecuación de una recta.

Ejemplos de ecuaciones de rectas:

$$\begin{aligned} 5y + 2x - 1 = 0 & \quad ; \quad y + 1 = 2x - 1 \\ y - 5 = 3(x + 1) & \quad ; \quad 2y - 5x + 1 = 3(x + y) \end{aligned}$$

Si bien existen diferentes formas, equivalentes entre ellas, de escribir la ecuación de una recta, la ecuación explícita de la recta es muy útil porque de ella se puede obtener los valores de la pendiente y la ordenada al origen por simple inspección.

**Ordenada al Origen**


La **ordenada al origen** es el punto donde la recta corta al eje  $y$ .

La **pendiente** de una recta indica de la “inclinación” de la misma y está directamente relacionada con el ángulo que forma la recta con los ejes coordenados.

**Pendiente**

Dada una recta  $L$  que pasa por los puntos  $P_1(x_1, y_1)$  y  $P_2(x_2, y_2)$ , como la de la siguiente figura, la pendiente de la recta se define como:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



**Aclaración:** Es importante remarcar que la pendiente es **independientemente de los puntos** que se utilicen para su cálculo.

### Ecuación de la recta a partir de un punto y la pendiente

Es común que se necesite encontrar la ecuación de una recta a partir de un punto que pertenece a la recta y su pendiente.

Dada una recta  $L$ , con pendiente conocida de valor  $m$  y suponiendo que se conoce un punto  $P_1(x_1; y_1) \in L$ , entonces su ecuación está dada por:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Ejemplo: Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto  $P_0(2, -3)$  y que tiene pendiente igual a  $-5$ .

Utilizamos la ecuación de la recta:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

En la que reemplazamos  $x_1$  e  $y_1$  por las coordenadas del punto, y  $m$  por el valor de la pendiente:

$$\begin{aligned} y - y_1 &= m(x - x_1) \\ y - (-3) &= -5(x - 2) \\ y + 3 &= -5(x - 2) \end{aligned}$$

La ecuación de la recta buscada es:  $y + 3 = -5(x - 2)$ . Podemos dejar la ecuación así o bien operar para expresarla en su forma explícita:

$$\begin{aligned} y + 3 &= -5(x - 2) \\ y + 3 &= -5x - 5(-2) \\ y &= -5x + 10 - 3 \\ y &= -5x + 7 \end{aligned}$$

### Ecuación de la recta a partir de dos puntos

En el caso en que se desea encontrar la ecuación de una recta de la que se conocen dos puntos  $P_1(x_1; y_1)$  y  $P_2(x_2; y_2)$ , ambos pertenecientes a la recta, se debe calcular la pendiente a partir de dichos puntos y luego proceder como en el caso anterior:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Luego:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

o

$$y - y_2 = m(x - x_2)$$

Ejemplo: Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos  $P_1(1, 3)$  y  $P_2(2, -5)$

Para poder utilizar la ecuación de la recta:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

necesitamos conocer un punto de la recta y la pendiente.

El punto ya lo tenemos, de hecho conocemos dos puntos y por lo tanto podemos elegir cualquiera de los dos indistintamente. Es decir que nos falta calcular la pendiente:

Utilizamos la ecuación de la pendiente, reemplazando en la misma las coordenadas de los dos puntos de la recta:

$$m = \frac{-5 - 3}{2 - 1}$$

$$m = \frac{-8}{1}$$

$$m = -8$$

Ya conocemos la pendiente:  $m = -8$ , entonces elegimos uno de los puntos que conocemos de la recta, por ejemplo el punto  $P_1(1, 3)$  y armamos la ecuación:

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 3 = -8(x - 1)$$

que es la ecuación de la recta pedida. Al igual que en el ejemplo anterior, podemos dejar la ecuación así u operar para obtener la ecuación explícita de la recta:

$$y - 3 = -8(x - 1)$$

$$y - 3 = -8x + 8$$

$$y = -8x + 8 + 3$$

$$y = -8x + 11$$

### 1.2.2. Gráfica de una recta a partir de su ecuación

Si conocemos la ecuación explícita de una recta  $y = mx + b$  podemos graficarla siguiendo los siguientes pasos:


1. Marcamos la ordenada al origen  $b$  sobre el eje  $y$ , que corresponde al punto  $(0, b)$  del plano coordenado.
2. Luego indentificamos la pendiente  $m$  y la escribimos como una fracción (si la pendiente es un número entero entonces la podemos escribir como una fracción con denominador igual a 1).
3. A partir del punto marcado en 1, nos desplazamos según la pendiente  $m$  de la siguiente manera:
  - La cantidad que indique el **numerador** en dirección del eje  $y$  positivo.
  - La cantidad que indique el denominador en dirección del eje  $x$  positivo.
  - Si la pendiente es negativa a **uno solo de los movimientos** lo hacemos en dirección contraria (es decir el número del numerador en la dirección del eje  $y$  negativo o el número del denominador en la dirección del eje  $x$  negativo).
4. Trazamos la recta que pasa por los dos puntos encontrados.

Ejemplo:

Sea la recta:  $y = -2x + 3$

Ubicamos el punto donde la recta corta al eje  $y$ :


$$y = -2x + 3$$




como  $m = -2 = -\frac{2}{1}$

$\Rightarrow$  desplazamos 2 unidades hacia abajo

$\Rightarrow$  desplazamos 1 hacia la derecha



Trazamos la recta que pasa por estos dos puntos



## CURSO DE INGRESO 2021 - MATEMÁTICA

### Ejercicios Capítulo 4

**En todos los ejercicios resolver sin usar calculadora, excepto que se aclare lo contrario**

- Representar en el plano los siguientes puntos y decir a que cuadrante pertenecen
  - $P_1(2, -1)$
  - $P_2(5/2, 3)$
  - $P_3(1/2, -2)$
  - $P_4(-3, -1/2)$
- Determinar si los siguientes puntos pertenecen a las rectas dadas.
  - $3x + 2y = 3$  ,  $P_0 = (1, 3)$  ;  $P_1 = (-1, 1)$  ;  $P_2 = (3, -3)$
  - $3x - 6 = 0$  ,  $P_0 = (-1, 0)$  ;  $P_1 = (2, 0)$  ;  $P_2 = (0, 2)$
  - $2y + 2x - 2 = 2(x - 1)$  ,  $P_0 = (1, 1)$  ;  $P_1 = (0, 1)$  ;  $P_2 = (3, 0)$
- Encontrar otros dos puntos que pertenezcan a las rectas del ejercicio anterior.
- Determinar si las siguientes rectas son paralelas a alguno de los ejes coordenados. Si no los son calcular la pendiente. Graficarlas.
  - $3x = -2y - 5$
  - $3x - 6 = 0$
  - $\frac{4}{5}y = 2x$
  - $y - 2 = 0$
  - $-x + 2y - 1 = 0$
  - $x + y = 3$
  - $y = 0$
  - $2y + 2x - 2 = 2(x - 1)$
- Identificar la pendiente y la ordenada al origen en las siguientes rectas.
  - $2x + 2y = 4$
  - $3y = 6 - x$
  - $y - 2 = 0$
  - $2y + x = 2(x - 1)$
  - $x = 4y + \frac{3}{4}$
- Indicar cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la ecuación de una recta, en caso afirmativo indicar pendiente, ordenada al origen y graficar.
  - $y + 2 = 3x$
  - $-3x + y = 0$
  - $\frac{1}{x} + 3 = y$
  - $x^2 + 2 = y$
- Hallar los puntos de intersección de las siguientes rectas con los ejes coordenados.
  - $y = 4x + 5$
  - $y = -x - 7$
  - $y = -x + 4$
  - $y = x$
- Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos dados. Graficarlas.

- a)  $P_1(2, 3)$   $P_2(4, 5)$       b)  $P_1(5, -1)$   $P_2(-5, -1)$       c)  $P_1(-1, 5)$   $P_2(-1, \frac{3}{4})$   
 d)  $P_1(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$   $P_2(0, 0)$       e)  $P_1(1, -1)$   $P_2(-1, 1)$

9. Determinar el valor de  $k$  para que el punto  $P_0$  pertenezca a la recta dada.


- a)  $2x + ky = 0$        $P_0(-1, 3)$   
 b)  $(k - 1)x + 3ky = 2(k + 1)$        $P_0(2, -2)$

10. Representar gráficamente las rectas dadas.


- a)  $5x + y = 3$       b)  $3x - 6 = 0$       c)  $x - 2 = 0$   
 d)  $y - 2 = 0$       e)  $4x - 3y = 6$       f)  $y = 0$

11. Analizar las gráficas de las siguientes rectas y encontrar sus ecuaciones.


a)




b)



c)



d)



12. Determinar la ecuación de la recta que cumple con la condición indicada en cada caso. Graficar.


- a) Pasa por  $P_0(-1, 5)$  y tiene pendiente  $-2$   
 b) Tiene pendiente  $0,75$  y corta al eje de las ordenadas en  $-3$   
 c) Pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente igual a  $4$

- d) Es horizontal y pasa por  $P_1(-9, -3)$
- e) Pasa por  $P_2(3, -5)$  y es vertical

## CURSO DE INGRESO 2021 - MATEMÁTICA

### Respuestas de los Ejercicios del Capítulo 4

1.



2. a)  $P_0 = (1, 3) \notin L$  ;  $P_1 = (-1, 1) \notin L$  ;  $P_2 = (3, -3) \in L$   
 b)  $P_0 = (-1, 0) \notin L$  ;  $P_1 = (2, 0) \in L$  ;  $P_2 = (0, 2) \notin L$   
 c)  $P_0 = (1, 1) \notin L$  ;  $P_1 = (0, 1) \notin L$  ;  $P_2 = (3, 0) \in L$
3. a)  $P_3 = (1, 0)$  ;  $P_4 = (-1, 3)$                       b)  $P_3 = (2, 1)$  ;  $P_4 = (2, -3)$   
 c)  $P_3 = (5, 0)$  ;  $P_4 = (-1, 0)$
4. a) No es paralela a ninguno de los ejes coordenados.  $m = \frac{3}{2}$   
 b) Paralela al eje y  
 c) No es paralela a ninguno de los ejes coordenados.  $m = \frac{5}{2}$   
 d) Paralela al eje x  
 e) No es paralela a ninguno de los ejes coordenados.  $m = \frac{1}{2}$   
 f) No es paralela a ninguno de los ejes coordenados.  $m = -1$   
 g) Ecuación del eje x  
 h) Ecuación del eje x
5. a)  $m = -1$  ;  $b = 2$                       b)  $m = -\frac{1}{3}$  ;  $b = 2$                       c)  $m = 0$  ;  $b = 2$   
 d)  $m = \frac{1}{2}$  ;  $b = -1$                       e)  $m = \frac{1}{4}$  ;  $b = -\frac{3}{16}$

6. a) Si.  $m = 3$ ,  $b = -2$

b) Si.  $m = 3$ ,  $b = 0$

c) No

d) No

7. Hallar los puntos de intersección de la recta L con los ejes coordenados.

a) Int. eje  $x$ :  $(-\frac{5}{4}, 0)$  Int. eje  $y$ :  $(0, 5)$

b) Int. eje  $x$ :  $(-\frac{7}{54}, 0)$  Int. eje  $y$ :  $(0, -7)$

c) Int. eje  $x$ :  $(4, 0)$  Int. eje  $y$ :  $(0, 4)$

d) Int. eje  $x$ :  $(0, 0)$  Int. eje  $y$ :  $(0, 0)$

8.

a)  $y = x + 1$

b)  $y = -1$

c)  $x = -1$

d)  $y = \frac{1}{2}x$


e)  $y = -x$

9.


a)  $k = \frac{2}{3}$

b)  $k = -\frac{2}{3}$


10. a)




b)




c)




d)



e)



f)



11. a)  $y = -2x + 3$

b)  $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{4}$

c)  $y = 4x$

d)  $y = -3$

e)  $x = 3$



Facultad de  
Ciencias Agrarias  
y Forestales



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

# CURSO DE INGRESO 2021

## Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

# MATEMÁTICA

## Capítulo 5

Material de apoyo para el curso de Nivelación de Matemática para los ingresantes a las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.

# 1. Logaritmos

## 1.1. Definición

Definición  
de logaritmo

Dados los número reales  $N > 0$ ,  $b > 0$  con  $b \neq 1$  y  $c$ , Se define el logaritmo como:

$$\log_b N = c \quad \Leftrightarrow \quad b^c = N$$

*Que se lee:* el logatirmo en base  $b$  de  $N$  es igual  $c$  si y solo si  $b$  elevado a la  $c$  es igual a  $N$ .

Base,  
argumento  
y resultado

$b$  es la **base** del logaritmo .

$N$  es el **argumento** del logaritmo.

$c$  es el **resultado** del logaritmo.

Ejemplos: Calcular los siguientes logaritmos:

$$\log_5 125 =$$

$$\log_2 1/2 =$$

$$\log_{25} 5 =$$

$$\log_5 125 = \quad \longrightarrow \quad \text{Buscamos a qué potencia debemos elevar el 5 para obtener 125}$$

$$\log_5 125 = \log_5 (5^3) \quad \longrightarrow \quad \text{Escribimos el 125 como una potencia de 5}$$

$$\log_5 125 = 3 \quad \longrightarrow \quad \text{El resultado es 3 porque } 5^3 \text{ es 125}$$

$$\log_2 (1/2) = \quad \longrightarrow \quad \text{Buscamos a qué potencia debemos elevar el 2 para obtener } \frac{1}{2}$$

$$\log_2 (1/2) = \log_2 (2^{-1}) \quad \longrightarrow \quad \text{Escribimos el } \frac{1}{2} \text{ como una potencia de 2}$$

$$\log_2 (1/2) = -1 \quad \longrightarrow \quad \text{El resultado es } -1 \text{ porque } 2^{-1} \text{ es } \frac{1}{2}$$

$$\log_{25} 5 = \log_{25} \sqrt{25} \quad \longrightarrow \quad \text{Sabemos que } \sqrt{25} = 5$$

$$\log_{25} 5 = \log_{25} (25^{\frac{1}{2}}) \quad \longrightarrow \quad \text{También sabemos que } \sqrt{25} = 25^{\frac{1}{2}}$$

$\longrightarrow$  Ya pudimos escribir al 5 como una potencia de 25

$$\log_{25} 5 = \frac{1}{2} \quad \longrightarrow \quad \text{el resultado es } \frac{1}{2} \text{ porque } 25^{\frac{1}{2}} \text{ es 5}$$

**Observación:** En general cuando se desea calcular el logaritmo en **base 10** se omite especificar la base y se escribe simplemente **log**.

Bases  
especiales

Ejemplo: Calcular el siguiente logaritmo:  $\log 1000$

$$\log 1000 = \log_{10} 1000 = \log_{10} 10^3 = 3$$

### 1.1.1. Propiedades del Logaritmo

Dados los números reales  $a$ ,  $b$ ,  $m$  y  $n$ , todos mayores que cero y además  $b \neq 1$ :

#### I Logaritmo de un producto

Logaritmo de  
un producto

$$\log_b (n.m) = \log_b n + \log_b m$$

**En palabras:** El logaritmo de un producto puede escribirse como una suma de los logaritmos de los factores.

#### II Logaritmo de un cociente

Logaritmo de  
un cociente

$$\log_b \left( \frac{n}{m} \right) = \log_b n - \log_b m$$

**En palabras:** El logaritmo de un cociente es igual a la resta entre el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador.

#### III Logaritmo de una potencia

Logaritmo de  
una potencia

$$\log_b a^n = n \log_b a$$

**En palabras:** El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base.

#### IV Cambio de base de un logaritmo

Fórmula del  
cambio de  
base

$$\log_b a = \frac{\log_n a}{\log_n b}$$

Esta propiedad permite calcular cualquier logaritmo en base  $b$  mediante otros logaritmos en cualquier otra base  $n$ .

A veces es necesario combinar varias propiedades para poder realizar una operación con logaritmos de forma más sencilla.

Ejemplo:

$$\begin{aligned}\log_3 \frac{81 \cdot 9^5}{\sqrt{27}} &= \log_3 81 \cdot 9^5 - \log_3 \sqrt{27} && \rightarrow \text{Propiedad del Cociente} \\ &= \log_3 81 + \log_3 9^5 - \log_3 27^{\frac{1}{2}} && \rightarrow \text{Propiedad del Producto} \\ &= \log_3 81 + 5 \log_3 9 - \frac{1}{2} \log_3 27 && \rightarrow \text{Propiedad de la Potencia} \\ &= 4 + 5 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 3 && \rightarrow \text{Definición de Logaritmo} \\ &= 4 + 10 - \frac{3}{2} = \frac{25}{2}\end{aligned}$$

## CURSO DE INGRESO 2021 - MATEMÁTICA

### Ejercicios Capítulo 5

**En todos los ejercicios resolver sin usar calculadora, excepto que se aclare lo contrario**

1. Calcular utilizando la definición

- |                  |                     |                    |                    |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| a) $\log_2 256$  | b) $\log_3 81$      | c) $\log_5 1/5$    | d) $\log_2 1/8$    |
| e) $\log_4 1/4$  | f) $\log_9 3$       | g) $\log_{1/3} 27$ | h) $\log_{10} 0,1$ |
| i) $\log_{10} 1$ | j) $\log_{10} 0,01$ | k) $\log_2 0,25$   | l) $\log_5 0,2$    |

2. Rescribir los siguientes logaritmos utilizando la propiedad indicada, luego resolver por definición:

- |  |  |
|--|--|
| a) $\log_2(64 \cdot 16)$ (Propiedad I) | b) $\log_3 \frac{27}{81}$ (Propiedad II) |
| c) $\log_4 16^7$ (Propiedad III)       | d) $\log_4 16$ (Propiedad III)           |
| e) $\log_9 27$ (Propiedad IV)          |  |

3. Calcular utilizando propiedades

- |   |  |  |
|---|--|--|
| a) $\log_2 \frac{1}{8}$                 | b) $\log_4 \frac{1}{4}$                  | c) $\log_4 \frac{16 \cdot 256}{64}$    |
| d) $\log_3(27^7 \cdot 9^{12})$          | e) $\log_2 \frac{\sqrt{8}}{256}$         | f) $\log_{10} \frac{\sqrt{1000}}{100}$ |
| g) $\log_5(\sqrt[5]{125} \sqrt[8]{25})$ | h) $\log_3 \frac{\sqrt{27}}{9 \cdot 81}$ |  |

4. Calcular, usando cambio de base

- |               |                         |                              |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| a) $\log_8 4$ | b) $\log_9 \frac{1}{3}$ | c) $\log_{125} \frac{1}{25}$ |
|---------------|-------------------------|------------------------------|

5. Calcular los siguientes logaritmos utilizando la calculadora.

- |                     |                        |                         |
|---------------------|------------------------|-------------------------|
| a) $\log_{10} 2000$ | b) $\log_{10} 50000$   | c) $\log_{10} 30000000$ |
| d) $\log_{10} 0,12$ | e) $\log_{10} 0,00015$ |                         |

6. Calcular los logaritmos del ejercicio 1) utilizando un cambio a la base 10 (los valores en la base 10 obténgalos de la calculadora).

## CURSO DE INGRESO 2021 - MATEMÁTICA

### Respuestas de los Ejercicios del Capítulo 5

1. a) 8            b) 4            c) -1            d) -3            e) -1            f)  $\frac{1}{2}$
- g) -3            h) -1            i) 0            j) -2            k) -2            l) -1
2. a) 10            b) -1            c) 14            d) 2            e)  $\frac{3}{2}$
3. a) -3            b) -1            c) 3            d) 45            e)  $-\frac{13}{2}$             f)  $-\frac{1}{2}$
- g)  $\frac{17}{20}$             h)  $-\frac{9}{2}$
4. a)  $\frac{2}{3}$             b)  $-\frac{1}{2}$             c)  $-\frac{2}{3}$
5. Ver respuestas ejercicio 1.



Facultad de  
Ciencias Agrarias  
y Forestales



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

# CURSO DE INGRESO 2021

## Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

# MATEMÁTICA

## Capítulo 6

Material de apoyo para el curso de Nivelación de Matemática para los ingresantes a las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.

# Índice

<b>1. Trigonometría</b>	<b>2</b>
1.1. Ángulos . . . . .	2
1.2. Teorema de Pitágoras . . . . .	3
1.3. Razones trigonométricas . . . . .	3

## 1. Trigonometría

La trigonometría es la rama de la matemática que estudia las relaciones que existen entre las medidas de los lados de un triángulo y las medidas de sus ángulos.

### 1.1. Ángulos

#### Definición

Un ángulo es una región del plano limitada por dos semirrectas que parten del mismo punto inicial. A las dos rectas se les denomina lados del ángulo y al punto inicial se le llama vértice del ángulo.

#### Sistema de medición de ángulos

Si bien el ángulo es invariante respecto de su posición en el plano, con el fin de facilitar definiciones, propiedades y cálculos, se suele referirlo a un sistema de coordenadas cartesiano.

Se dice que un ángulo está en posición normal si su vértice se ubica en el origen de coordenadas y su lado inicial coincide con el semieje  $x$  positivo.

En general se utilizan dos sistemas de medición:

- El **sistema sexagesimal**, que tiene por unidad el grado y en que la circunferencia completa mide  $360^\circ$ .
- El **sistema circular**, cuya unidad es el radián y en que la circunferencia completa mide  $2\pi$  radianes.

#### Equivalencia

Como la circunferencia completa mide  $360^\circ$  en el sistema sexagesimal y  $2\pi$  radianes, entonces un ángulo de  $360^\circ$  sexagesimales equivale a uno de  $2\pi$  radianes. Esta relación permite pasar de un sistema de medición angular a otro.


#### Ángulos complementarios y suplementarios

**Ángulos complementarios:** Dos ángulos agudos son complementarios si se cumple suman  $90^\circ$ :


$\alpha$  y  $\beta$  son complementarios si se cumple:  $\alpha + \beta = 90^\circ$

**Ángulos suplementarios:** Dos ángulos son suplementarios si se cumple que suman  $180^\circ$ :

$\alpha$  y  $\beta$  son suplementarios si se cumple:  $\alpha + \beta = 180^\circ$



Complementarios




Suplementarios

## 1.2. Teorema de Pitágoras

**Triángulo Rectángulo:** Es un triángulo con un ángulo recto, es decir de  $90^\circ$ .

**Hipotenusa y Catetos:** En un triángulo rectángulo se llama hipotenusa al lado opuesto al ángulo recto y catetos a los lados adyacentes al ángulo recto.


En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. **Teorema de Pitágoras**



$$a^2 + b^2 = h^2$$

## 1.3. Razones trigonométricas

Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados de los triángulos rectángulos y sólo dependen de los ángulos de éste. **Razones trigonométricas**



$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{a}{h}$$

$$\text{cos } \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{h}$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{a}{b}$$

**Aclaración:** Debido a la definición de  $\operatorname{tg} \alpha$  se puede deducir que:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{cos} \alpha}$$

**Resolver** un triángulo rectángulo significa averiguar la medida de sus tres lados y sus tres ángulos.

**Propiedad 1:** Para cualquier ángulo  $\alpha$  se cumple que:

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1$$

**Propiedad 2:** Los ángulos interiores de cualquier triángulo suman  $180^\circ$ .

## Ángulos especiales


Razones  
trigonométricas  
de ángulos  
especiales

ángulo	seno	coseno	tangente
$0^\circ$	0	1	0
$30^\circ$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$
$45^\circ$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$60^\circ$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

Ejemplo:

Resolver un triángulo rectángulo si se sabe que uno de sus catetos mide  $2 \text{ cm}$  y su ángulo adyacente es de  $60^\circ$

Primero hacemos un esquema del problema:



Como sabemos que la suma de los ángulos interiores del triángulo debe ser  $180^\circ$ , podemos calcular el ángulo que nos falta conocer ( $\alpha$ ):

$$60^\circ + \alpha + 90^\circ = 180^\circ \implies \alpha = 30^\circ$$

Utilizando las relaciones trigonométricas podemos calcular el otro cateto o la hipotenusa, dependiendo de cuál de las identidades utilizemos:

$$\operatorname{cos} \beta = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{a}{h}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{2 \text{ cm}}{h} \implies h = \frac{2 \text{ cm}}{\cos 60^\circ} = \frac{2 \text{ cm}}{1/2} = 4 \text{ cm}$$

Para calcular el cateto que nos falta podemos utilizar el teorema de Pitágoras:  $h^2 = a^2 + b^2$  o bien utilizar la  $\text{tg } \beta$ :

$$\text{tg } \beta = \frac{\text{Cateto opuesto}}{\text{Cateto adyacente}} = \frac{b}{a}$$

$$\text{tg } 60^\circ = \frac{b}{2 \text{ cm}} \implies b = 2 \text{ cm} \cdot \text{tg } 60^\circ = 2 \text{ cm} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

**Respuesta:** los elementos del triángulo son:  $b = 2\sqrt{3} \text{ cm}$ ,  $h = 4 \text{ cm}$  y  $\alpha = 30^\circ$

## CURSO DE INGRESO 2021 - MATEMÁTICA

### Ejercicios Capítulo 6


**En todos los ejercicios resolver sin usar calculadora, excepto que se aclare lo contrario**

En cada uno de los siguientes ejercicios realice un gráfico que esquematice la situación.

1. Resolver los siguientes problemas

- Calcular cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo, sabiendo que sus catetos miden  $3\text{ cm}$  y  $4\text{ cm}$ .
- Si el cateto mayor de un triángulo mide  $\sqrt{12}$ , ¿cuánto mide el cateto menor, si su hipotenusa mide el doble que éste?

2. Con referencia un triángulo como el de la figura, resolver usando la calculadora:



- Dados  $\alpha = 32^\circ$  y  $a = 12$ . Calcular:  $b$ ,  $h$  y  $\beta$ .
- Dados  $\alpha = 42^\circ$  y  $h = 28$ . Calcular:  $b$ ,  $a$  y  $\beta$ .
- Dados  $a = 14$  y  $b = 35$ . Calcular:  $h$ ,  $\alpha$  y  $\beta$ .
- Dados  $h = 145$  y  $a = 92$ . Calcular:  $b$ ,  $\alpha$  y  $\beta$ .

3. Resolver utilizando la calculadora

- Calcular cuánto mide un cateto de un triángulo rectángulo, sabiendo que la hipotenusa mide  $12\text{ m}$  y el otro cateto mide  $4\text{ m}$ .
- Calcular cuánto mide la diagonal de un cuadrado de lado  $9\text{ m}$ .
- Calcular cuánto mide el lado de un cuadrado cuya diagonal es de  $1,5\text{ km}$ .

4. Resolver los siguientes ejercicios utilizando los valores de las razones trigonométricas de los ángulos especiales (ver tabla en la página 4 del Capítulo 6)

- a) ¿Cuánto vale la hipotenusa de un triángulo si uno de sus catetos vale  $5\sqrt{3}$  y el ángulo comprendido entre ellos vale  $30^\circ$ ?
- b) En un triángulo cuya hipotenusa vale 7, ¿cuánto vale el coseno del ángulo cuyo cateto adyacente vale 4?
- c) Si en un triángulo la hipotenusa vale 10 y uno de sus catetos vale 8, ¿cuánto vale el coseno del ángulo opuesto a dicho cateto?
- d) ¿Cuánto vale la tangente de un ángulo si su seno vale  $\frac{\sqrt{7}}{4}$  y su coseno vale  $\frac{3}{4}$ ?
5. Resolver usando la calculadora.
- a) Se piensa construir una pista de aviación, al final de la misma quedará una arboleda de 25 m de altura. ¿A qué distancia mínima de la arboleda debe terminar la pista si el ángulo de despegue de los aviones es de  $16^\circ$ ?
- b) Un automóvil asciende una cuesta que tiene una inclinación de  $2^\circ$  con la horizontal. Si viaja a una velocidad de 60 km/h, ¿cuántos metros varía su altura sobre el nivel del mar en 15 minutos?





Facultad de  
Ciencias Agrarias  
y Forestales



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

# CURSO DE INGRESO 2021

## Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

# MATEMÁTICA

## Anexos

Material de apoyo para el curso de Nivelación de Matemática para los ingresantes a las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.

## Índice

<b>Anexo I: Mínimo Común Múltiplo</b>	<b>2</b>
<b>Anexo II: Notación científica y unidades</b>	<b>3</b>
<b>Anexo III: Perímetros, áreas y volúmenes</b>	<b>9</b>

## Anexo I: Mínimo Común Múltiplo

### Descomposición en factores primos

Descomposición  
en factores  
primos

Todo número natural se puede escribir de forma única como un producto de números primos. A este proceso se lo llama **descomposición en factores primos**, descomposición prima, descomposición factorial o a veces simplemente factorización.

Para lograr esto se suele dividir al número sucesivamente por sus divisores primos (generalmente en orden creciente), hasta que el cociente sea 1. Una forma de hacerlo es la siguiente:

- Se coloca el número a descomponer, seguido de una gran raya vertical.
- Luego se lo divide por el primer divisor primo que le encontremos (anotándolo a la derecha de la raya vertical) y se anota el cociente debajo del número original.
- Dividimos ahora el cociente obtenido por el primer divisor primo que le encontremos y repetimos el proceso hasta que el cociente sea 1.
- Por último, la descomposición en factores primos del número buscado será el producto de todos los divisores que escribimos en la columna de la derecha.

Ejemplo:

60	2	60	2	60	2	60	2
		30	2	30	2	30	2
				15	3	15	3
					5	5	5
						1	

Por lo tanto  $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$  y esa es su descomposición en factores primos.

### Cálculo del Mínimo Común Múltiplo:

Mínimo  
Común  
Múltiplo

Se llama **mínimo común múltiplo** (que de ahora en más denotaremos MCM) de dos o más números naturales al menor número natural que es múltiplo de ellos. Para encontrar dicho número se puede seguir el siguiente método:

- Se encuentra la descomposición en factores primos de cada uno de los números.
- Se toma cada factor primo que aparezca en alguna de las descomposiciones (ya sea que esté repetido o no) elevado a su mayor exponente.

Ejemplo:

Para hallar el MCM entre 60, 8 y 18 (que podremos denotar como  $\text{MCM}(60, 8, 18)$ ) lo primero que hacemos es encontrar sus descomposiciones en factores primos:

60	2	8	2	18	2	Por lo tanto: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ $8 = 2^3$ $18 = 2 \cdot 3^2$
30	2	4	2	9	3	
15	3	2	2	3	3	
5	5	1		1		
1						

Los únicos factores primos que aparecen en estas descomposiciones son 2, 3 y 5. Además, el máximo exponente a que aparece elevado el 2 es 3, el máximo exponente a que aparece elevado el 3 es 2 y el máximo exponente a que aparece elevado el 5 es 1. Por lo tanto:

$$\text{MCM}(60, 8, 18) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$$

**Aclaración:** El MCM de dos o más números **nunca podrá ser menor que cualquiera de ellos**. A lo sumo podrá ser igual a alguno de ellos, si es que éste es múltiplo de todos los demás. Por ejemplo, el  $\text{MCM}(2, 16, 8) = 16$ , ya que 16 es múltiplo de 8 y de 2.

## Anexo II: Notación científica y Conversión de unidades

### Notación científica

La notación científica es una manera de representar un número utilizando potencias de base diez. Se utiliza para poder expresar números muy grandes o muy pequeños.

Los números se escriben como un producto:

$$a \times 10^n \quad \text{o} \quad a \cdot 10^n \quad \text{o} \quad a 10^n$$

donde:  $a$  es un número real mayor o igual que 1 y menor que 10 o mayor que  $-10$  y menor o igual que  $-1$ , que recibe el nombre de **coeficiente** y  $n$  es un número entero, que recibe el nombre de exponente u **orden de magnitud**.

Ejemplos:

$$5,25 \cdot 10^4 \qquad 6,023 \cdot 10^{23} \qquad -2,233 \cdot 10^3 \qquad 9 \times 10^{-9}$$

**Aclaración:** Expresiones como  $12,05 \times 10^6$ ,  $0,23 \cdot 10^{-2}$  o  $-34,55 \cdot 10^3$  no entrarían dentro de la definición formal de notación científica (ya que el coeficiente no cumple con los requerimientos que impone la definición), pero en la práctica podrían resultar igualmente útiles.

### Algunas potencias de 10

**Cuando los exponentes son mayores o iguales que cero**

$$\begin{aligned}
10^0 &= 1 \\
10^1 &= 10 \\
10^2 &= 100 \\
10^3 &= 1000 \\
10^4 &= 10000 \\
10^5 &= 100000 \\
10^{10} &= 10000000000 \\
10^{20} &= 100000000000000000000
\end{aligned}$$

**Cuando los exponentes son menores que cero**

$$\begin{aligned}
10^{-1} &= 1/10 = 0,1 \\
10^{-2} &= 1/10^2 = 0,01 \\
10^{-3} &= 1/10^3 = 0,001 \\
10^{-4} &= 1/10^4 = 0,0001 \\
10^{-5} &= 1/10^5 = 0,00001 \\
10^{-10} &= 1/10^{10} = 0,0000000001 \\
10^{-20} &= 1/10^{20} = 0,00000000000000000001
\end{aligned}$$

**Algunos datos en forma tradicional** (aproximados)

La masa de la tierra es de 59800000000000000000000000 *kg*  
 La masa del electrón es de 0,00000000000000000000000000000911 *kg*  
 El número de Avogadro es 602000000000000000000000 partículas/mol  
 La velocidad de la luz en el vacío es 299790000 *m/s*  
 La longitud de una célula típica es 0,000050 *m*  
 La longitud de onda de la luz amarilla es 0,000000589 *m*

**Los datos anteriores expresados en notación científica**

La masa de la tierra es 5,98  $10^{24}$  *kg*  
 La masa del electrón es 9,11  $10^{-31}$  *kg*  
 El número de Avogadro es 6,02  $10^{23}$  partículas/mol  
 La velocidad de la luz en el vacío es 2,9979  $10^8$  *m/s*  
 La longitud de una célula típica es 5  $10^{-5}$  *m*  
 La longitud de onda de la luz amarilla es 5,89  $10^{-7}$  *m*

**Producto y cociente de números expresados en notación científica**

La notación científica es especialmente práctica a la hora de realizar productos o cocientes de números expresados de esta forma, ya que se opera por un lado con los coeficientes (realizando la operación adecuada) y por otro lado con las potencias de 10 (utilizando las propiedades de la potencia).

$$4,3 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^5 = 8,6 \cdot 10^8 \qquad \frac{8,1 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^2} = 2,7 \cdot 10^{-8}$$

## Suma y resta de números expresados en notación científica

**Exponentes iguales** Si se suman números del mismo orden de magnitud:

- Se suman los coeficientes, si la suma es mayor o igual que 1 y menor que 10 (o mayor que -10 y menor o igual que -1) se mantiene el mismo orden de magnitud

$$3,2 \cdot 10^{12} + 4,9 \cdot 10^{12} = 8,1 \cdot 10^{12}$$

$$8,9 \cdot 10^{-10} - 2,7 \cdot 10^{-10} = 7,2 \cdot 10^{-10}$$

$$-1,4 \cdot 10^3 - 2,5 \cdot 10^3 = -3,9 \cdot 10^3$$

- Se suman los coeficientes, si la suma es mayor o igual que 10 (o menor o igual que -10 o se encuentra entre -1 y 1), se convierte el coeficiente a notación científica sumando el orden de magnitud del coeficiente al orden de magnitud original.

$$3,2 \cdot 10^{12} + 8,9 \cdot 10^{12} = 12,1 \cdot 10^{12} = 1,21 \cdot 10^1 \cdot 10^{12} = 1,21 \cdot 10^{13}$$

$$5,2 \cdot 10^{-3} - 6 \cdot 10^{-3} = -0,8 \cdot 10^{-3} = -8 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-3} = -8 \cdot 10^{-4}$$

**Exponentes distintos** Se expresan los números con el orden de magnitud mayor y se suman los coeficientes como en los casos anteriores.

$$4 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^8 = 0,04 \cdot 10^8 + 3 \cdot 10^8 = 3,04 \cdot 10^8$$

$$5 \cdot 10^{-7} - 4 \cdot 10^{-8} = 5 \cdot 10^{-7} - 0,4 \cdot 10^{-7} = 4,6 \cdot 10^{-7}$$

$$3,2 \cdot 10^{-7} - 5,9 \cdot 10^{-5} = 0,032 \cdot 10^{-5} - 5,9 \cdot 10^{-5} = -5,868 \cdot 10^{-5}$$

$$9,9 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^4 = 9,9 \cdot 10^5 + 0,3 \cdot 10^5 = 10,2 \cdot 10^5 = 1,02 \cdot 10^6$$

## Prefijos

Los prefijos del Sistema Internacional (SI) se usan para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad, ya sean unidades básicas o derivadas. Estos prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma. Los símbolos de los prefijos se anteponen a los símbolos de las unidades.

Los prefijos pertenecientes al SI los fija oficialmente la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (Bureau International des Poids et Mesures), de acuerdo con el cuadro siguiente:

### Potencias positivas de 10



**Unidades lineales** Cuando se trata de múltiplos o submúltiplos de una misma unidad lineal (por ejemplo de  $mm$  a  $nm$  o de  $ml$  a  $cl$ ) una forma de trabajar puede ser comparando los órdenes de magnitud (las potencias de 10) de ambos múltiplos y así obtener una equivalencia entre las mismas.

Conversión de unidades lineales comparando órdenes de magnitud

Supongamos, por ejemplo, que queremos expresar en  $km$  una medida de  $27\text{ cm}$ . Como el prefijo  $k$  (kilo) corresponde a  $10^3$  y en prefijo  $c$  (centi) corresponde a  $10^{-2}$ , eso quiere decir que existen 5 órdenes de magnitud de diferencia entre los dos múltiplos. Ahora bien, como  $k$  (kilo) es mayor que  $c$  (centi), eso quiere decir que  $1\text{ km}$  equivale a  $10^5\text{ cm}$  (o  $1\text{ cm}$  equivale a  $10^{-5}\text{ km}$ ). Por lo tanto:

$$27\text{ cm} = 27 \cdot 10^{-5}\text{ km} = 2,7 \cdot 10^{-4}\text{ km}$$

Otra forma de trabajar sería utilizando factores de conversión. Este método también requiere conocer una equivalencia entre las dos unidades que se quieren convertir, pero esta vez se multiplicará la medida original por una fracción que tendrá en cuenta dicha equivalencia. El numerador de esta fracción constará de la unidad a la que se quiere llegar y el denominador constará de la unidad de la que se parte, de forma que las unidades se simplifiquen. Utilizando el mismo ejemplo anterior:

Conversión de unidades lineales utilizando factores de conversión

$$27\text{ cm} = 27\cancel{\text{ cm}} \cdot \frac{1\text{ km}}{10^5\cancel{\text{ cm}}} = 27 \cdot 10^{-5}\text{ km} = 2,7 \cdot 10^{-4}\text{ km}$$

Este método es de especial utilidad cuando las unidades que se desean convertir no están relacionadas entre sí por potencias de 10 (como por ejemplo de horas a segundos o de pulgadas a  $cm$ ), o cuando las unidades son combinadas (por ejemplo de  $km/h$  a  $m/s$  o  $\frac{g}{cm\ s}$  a  $\frac{kg}{m\ s}$ ). En este último caso se usará una fracción por cada unidad que se quiera convertir y la posición de las unidades dentro de cada fracción será de forma tal que las unidades originales se cancelen.

Ejemplos:

$$45\text{ s a h} \quad 45\text{ s} = 45\cancel{\text{ s}} \cdot \frac{1\text{ h}}{3600\cancel{\text{ s}}} = \frac{45}{3600}\text{ h} = 0,0125\text{ h}$$

$$50\text{ m/s a km/h} \quad 50\frac{\text{m}}{\text{s}} = 50\frac{\cancel{\text{ m}}}{\cancel{\text{ s}}} \cdot \frac{1\text{ km}}{10^3\cancel{\text{ m}}} \cdot \frac{3600\cancel{\text{ s}}}{1\text{ h}} = \frac{180000\text{ km}}{10^3\text{ h}} = 180\frac{\text{km}}{\text{h}}$$

**Unidades cuadráticas o cúbicas** Cuando se trate de unidades cuadráticas o cúbicas se hará la conversión de la unidad lineal (con alguno de los métodos explicados anteriormente) y se elevará a la potencia adecuada.

Conversión de unidades cuadráticas o cúbicas

Ejemplos:

$$5\text{ cm}^2\text{ a m}^2 \quad 5\text{ cm}^2 = 5(\mathbf{10^{-2}\text{ m}})^2 = 5(10^{-2})^2\text{ m}^2 = 5 \cdot 10^{-4}\text{ m}^2$$

$$3\text{ m}^3\text{ a mm}^3 \quad 3\text{ m}^3 = 3\text{ m}^3 \cdot \left(\frac{1\text{ mm}}{10^{-3}\text{ m}}\right)^3 = 3\cancel{\text{ m}^3} \cdot \frac{1^3\text{ mm}^3}{(10^{-3})^3\cancel{\text{ m}^3}} = 3 \cdot 10^9\text{ mm}^3$$

**Aclaración:** Cuando se tenga que pasar unidades de volumen de dos sistemas de medición distintos (como por ejemplo de  $l$  a  $m^3$  o de  $cm^3$  a  $ml$ ) se hará el pasaje como si las unidades fueran lineales, usando por ejemplo alguna de las siguientes equivalencias:

$$1000\text{ cm}^3 \text{ — } 1\text{ l} ; \quad 1\text{ m}^3 \text{ — } 1000\text{ l} ; \quad 1\text{ cm}^3 \text{ — } 1\text{ ml} ; \quad 1\text{ dm}^3 \text{ — } 1\text{ l}$$

Ejemplos:

$$50 \text{ l a } m^3 \qquad 50 \text{ l} = 50 \text{ l} \cdot \frac{1 \text{ m}^3}{1000 \text{ l}} = 0,05 \text{ m}^3$$

$$300 \text{ cm}^3 \text{ a } cl \qquad 300 \text{ cm}^3 = 300 \text{ ml} = 300 \text{ ml} \cdot \frac{1 \text{ cl}}{10 \text{ ml}} = 30 \text{ cl}$$

## Ejercicios

**Resolver sin usar calculadora, excepto que se aclare lo contrario**

1. Escribir en notación científica los siguientes números

- |           |           |             |          |               |
|-----------|-----------|-------------|----------|---------------|
| a) 2000   | b) 50000  | c) 30000000 | d) 0,12  | e) 0,00015    |
| f) 2324   | g) 240000 | h) 0,004    | i) 234   | j) 0,00444    |
| k) 12,22  | l) 12     | m) 0,0003   | n) -23   | ñ) -0,0000045 |
| o) 1,0005 | p) 289,6  | q) 0,2      | r) -0,51 | s) 0,03004    |

2. Realizar las siguientes operaciones, expresar el resultado en notación científica

- |   |  |  |
|---|--|--|
| a) $10 \cdot 10^3$                        | b) $3 \cdot 10^4 / 10^2$                     | c) $4 \cdot 10^{-2} / 2 \cdot 10^{-8}$   |
| d) $10^4 + 10^3$                          | e) $10^4 \cdot 10^4$                         | f) $10 (10^3 + 10^5)$                    |
| g) $10^2 \cdot 10^5 \cdot 10^3$           | h) $12 \cdot 10^5 / 3000$                    | i) $34 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^{-4}$ |
| j) $-5,3 \cdot 10^{14} - 4 \cdot 10^{12}$ | k) $(0,0003 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^{-1})^3$ | l) $21 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-3}$ |

3. Realizar las operaciones del inciso anterior utilizando la calculadora

4. Realizar las siguientes conversiones de unidades

- |                                |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| a) 2,3 cm a m                  | b) 25 mm a m       | c) 325 cm a dm     |
| d) $2 \cdot 10^4$ m a km       | e) 16 $\mu$ m a m  | f) 250 km a m      |
| g) 455 kg a hg                 | h) 14 mg a $\mu$ g | i) 8 ng a $\mu$ g  |
| j) 3,5 Mg a $\mu$ g            | k) 789 kg a cg     | l) 5,5 dg a hg     |
| m) $7,9 \cdot 10^{-8}$ Gs a ms | n) 0,14 ks a cs    | ñ) 48 $\mu$ s a Ts |

5. Realizar las siguientes conversiones de unidades

- |   |   |  |
|---|---|--|
| a) 28 cm <sup>2</sup> a m <sup>2</sup>              | b) 5 m <sup>2</sup> a cm <sup>2</sup>       | c) 625 cm <sup>2</sup> a dm <sup>2</sup> |
| d) $12 \cdot 10^4$ m <sup>2</sup> a km <sup>2</sup> | e) 81 $\mu$ m <sup>2</sup> a m <sup>2</sup> | f) 50 km <sup>2</sup> a m <sup>2</sup>   |
| g) 5 m <sup>3</sup> a cm <sup>3</sup>               | h) 1000 cm <sup>3</sup> a mm <sup>3</sup>   | i) 18 nm <sup>3</sup> a m <sup>3</sup>   |
| j) 8,5 km <sup>3</sup> a cm <sup>3</sup>            | k) 7 dm <sup>3</sup> a cm <sup>3</sup>      | l) 4,2 m <sup>3</sup> a l                |
| m) $2,9 \cdot 10^2$ mm <sup>3</sup> a l             | n) 300 l a m <sup>3</sup>                   | ñ) 400 ml a m <sup>3</sup>               |
| o) 2400 kg/m <sup>3</sup> a g/cm <sup>3</sup>       | p) 72 km/h a m/s                            | q) 75 m/s a km/h                         |

## Anexo III: Perímetros, áreas y volúmenes


Perímetros, áreas y volúmenes de algunos objetos geométricos básicos:



Rectángulo

Área  $A = a b$


Perímetro  $P = 2a + 2b$



Circunferencia

Área  $A = \pi r^2$


Perímetro  $P = 2\pi r$



Triángulo

Área  $A = (ah) / 2$


Perímetro  $P = a + b + c$



Paralelepípedo rectangular recto

Área exterior  $A = 2ab + 2ac + 2bc$


Volumen  $V = abc$



Cilindro

Área exterior  $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h$

Volumen  $V = \pi r^2 h$




Esfera

Área exterior  $A = 4\pi r^2$

Volumen  $V = 4/3 \pi r^3$

**Aclaración:** El volumen  $V$  de un cuerpo de sección transversal constante en toda su altura se puede calcular fácilmente como el producto del área de la base  $A_b$  por su altura  $h$



$$V = A_b \cdot h$$

## Ejercicios

**Resolver sin usar calculadora, excepto que se aclare lo contrario**

1. Resolver los siguientes problemas
  - a) Hallar el área de un triángulo cuya base es de  $1,5\text{ m}$  y su altura es de  $4\text{ m}$ .
  - b) ¿Cuál es el radio de una circunferencia de  $5\pi\text{ cm}$  de perímetro?
  - c) ¿Cuánto vale el perímetro de un cuadrado cuya área es de  $9\text{ m}^2$ ?
  - d) Hallar el volumen de una caja de  $2\text{ dm}$  de largo,  $10\text{ cm}$  de ancho y  $0,12\text{ m}$  de alto.
  - e) ¿Qué altura tiene una caja de  $3\text{ l}$  de capacidad, cuya base mide  $20\text{ cm}$  por  $15\text{ cm}$ ?
  - f) ¿Cuántos  $\text{m}^3$  de tierra hay en los primeros  $5\text{ cm}$  de suelo de un terreno de  $100$  hectáreas ( $1\text{ hectárea} = 1\text{ hm}^2$ )?
  - g) ¿Qué superficie tendrá la base de un bloque de hielo de  $10\text{ cm}$  de espesor, cuyo volumen es de  $2\text{ m}^3$ ?
  - h) ¿Cuántos litros de agua caen en un terreno de  $2000\text{ m}^2$  de superficie durante una lluvia en la que caen  $15\text{ mm}$  de agua?
2. Resolver los siguientes ejercicios utilizando la calculadora
  - a) Hallar el perímetro de una circunferencia de radio  $10\text{ cm}$ . Expresarlo en  $m$  utilizando la notación científica.
  - b) Hallar el área del círculo que encierra la circunferencia anterior. Expresarla en  $\text{m}^2$ .
  - c) ¿Cuántos litros de agua recolecta un tanque australiano de  $5\text{ m}$  de diámetro durante una precipitación de  $20\text{ mm}$ ?
  - d) Hallar la arista de un cubo cuyo volumen es de  $27\text{ cm}^3$ .
  - e) Hallar la superficie exterior del cubo anterior. Expresarlo en  $\text{m}^2$ .
  - f) Calcular la altura de un cilindro, en  $m$ , si su superficie exterior es de  $2\text{ m}^2$  y el radio de su base es de  $20\text{ cm}$ .
  - g) Hallar el volumen del espacio comprendido entre dos esferas concéntricas de radios  $r_1 = 6\text{ cm}$  y  $r_2 = 9\text{ cm}$ . Expresarlo en  $\text{m}^3$  utilizando la notación científica.
  - h) Dos cilindros coaxiales tienen una altura igual a  $2\text{ m}$  y los radios de  $3\text{ mm}$  y  $6\text{ mm}$ . Calcular, en  $\text{cm}^3$ , el volumen comprendido entre los dos cilindros.